

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

Vous devez signaler ce traitement lors d'une consultation chez un nouveau médecin.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.

Ne prenez pas de médicaments même vendus sans ordonnance :



contre la toux,
pour décongestionner le nez,
pour la perte de poids ou contre l'appétit,
ainsi que les médicaments inhalés
contre l'asthme.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



NARDIL® Phénelzine

Boite de 60 comprimés à 15 mg

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé pour les épisodes dépressifs majeurs en cas d'échec avec d'autres thérapeutiques.

Ce médicament est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières autorisées à la rétrocession (vente au public).



Comment prendre votre médicament?

Dose de départ = 3 comprimés par jour, par étapes.

La posologie peut ensuite progressivement augmenter afin d'obtenir une efficacité optimale.

Une période de plusieurs semaines est nécessaire avant d'évaluer l'efficacité de ce traitement.

Votre médecin vous prescrira ensuite la dose minimale efficace. Cette dose varie d'une personne à une autre.

Les comprimés sont à prendre au cours du repas avec un peu d'eau.

Que faire en cas d'oubli d'une dose?



Prenez immédiatement la dose oubliée puis la dose suivante à l'heure habituelle.

Ne doublez jamais la dose.



A conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité



A conserver hors de portée des enfants

Ne pas utiliser après la date de péremption

Quelques conseils



Les aliments suivants sont à éviter : hareng fumé, foie, saucisse sèche, pois, haricots secs, choucroute, fromages et yaourts fermentés, bière, vin, extraits de levure, quantités excessives de caféine et chocolat.



N'arrêtez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin : risque d'effets indésirables graves.



Informez votre médecin :

- Si vous devez subir une opération chirurgicale avec anesthésie générale,
- Si vous présentez des idées suicidaires ou d'automutilation.









Si vous envisagez une grossesse, si vous souhaitez allaiter, parlez-en à votre médecin.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés sur cette fiche, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Les effets indésirables (EI) peuvent ne jamais apparaître et sont différents d'une personne à une autre. Les EI, en grande majorité, ne sont pas graves. Certains régressent dès la première semaine de traitement.

Il faut les connaître pour pouvoir les identifier et les éviter. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin qui recherchera une solution pour les atténuer, voire les faire disparaître.

| Effet indésirable | | Que dois je faire? |
|---|---|--|
|  | Maux de tête | Si la douleur est trop importante parlez-en à votre médecin. |
|  | Vertiges, hypotension | Pour diminuer les vertiges, évitez de vous lever trop brusquement ou asseyez-vous. |
|  | Constipation, sécheresse de la bouche | Buvez beaucoup d'eau. Adoptez un régime à base de fibres (légumes verts, fruits...). |
|  | Somnolence, perturbations du sommeil, fatigue | Attention à la conduite automobile. |
|  | Augmentation de poids | Faites attention à votre alimentation. |
|  | œdème | Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. En cas de prise de poids rapide, informez -en votre médecin |
| | Perturbations sexuelles | Informez votre médecin. |