

# Natamycine

NATACYN®

## Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction de prescripteurs

## Présentation et caractéristiques

Antifongique fongicide, actif sur *Candida*, *Aspergillus*, *Cephalosporium*, *Fusarium* et *Penicillium*

### Présentation :

- Collyre 5% (flacon multidoses de 15mL – boîte de 1 flacon)  
*Excipients : Chlorure de benzalkonium, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, eau ppi*

### Caractéristiques :

- Conservation à T° ambiante < 24°C
- Après ouverture : à utiliser dans les 14 jours

## Indications

- Infections oculaires fongiques : blépharites, kératites ou conjonctivites, dues en particulier à *Fusarium solani*

## Posologie et mode d'administration

<u>Kératite fongique</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posologie initiale : 1 goutte toutes les heures ou toutes les 2 heures</li> <li>▶ Puis après 3 ou 4 jours : 1 goutte 6 à 8 fois /jour</li> <li>▶ Traitement pendant 14 à 21 jours en moyenne, jusqu'à résolution de l'infection.</li> </ul>
<u>Blépharite et conjonctivite fongiques</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1 goutte 4 à 6 fois /jour</li> </ul>

- ▶ Se laver soigneusement les mains avant administration du collyre.
- ▶ Administration dans le sac conjonctival.
- ▶ Bien agiter avant emploi.
- ▶ Réévaluer le traitement en l'absence d'amélioration clinique au bout de 7-10 jours.

## Interactions médicamenteuses

- NA

## Principaux effets indésirables

- Réactions allergiques
- Troubles oculaires : inconfort, troubles de la vision, opacification de la cornée, œdème oculaire, irritations, douleurs, sensation de corps étranger, déchirure
- Dyspnée
- Douleurs thoraciques
- Paresthésies


## Contre-indications


- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients
- Port de lentilles de contact pendant la durée du traitement
- Patients < 18 ans (pas de données)


## Précautions d'emploi


- Grossesse, allaitement

## Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Natacyn® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

