

# Fentanyl transmuqueux

## ACTIQ®

FICHE  
CONSEIL  
Professionnel

### Présentation et caractéristiques

ACTIQ® est un **antalgique-analgésique apparenté à la morphine** indiqué pour soulager les accès douloureux paroxystiques (ADP) pour les douleurs chroniques. Actiq® est toujours associé à un traitement de fond morphinique.

Dosages	Présentations
Actiq® 200 µg	Comprimé avec applicateur buccal Boîte de 3
Actiq® 400 µg	
Actiq® 600 µg	
Actiq® 800 µg	
Actiq® 1200 µg	
Actiq® 1600 µg	

### Indications

Actiq® est indiqué pour le **traitement des accès douloureux paroxystiques chez des patients recevant déjà un traitement de fond morphinique pour des douleurs chroniques d'origine cancéreuse.**

*Un accès douloureux paroxystique est une exacerbation passagère d'une douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond.* Les patients recevant un traitement de fond morphinique sont ceux prenant au moins 60 mg de morphine par voie orale par jour, au moins 25 microgrammes de fentanyl transdermique par heure, au moins 30 mg d'oxycodone par jour, au moins 8 mg d'hydromorphone par voie orale par jour ou une dose équianalgésique d'un autre opioïde pendant une durée d'au moins une semaine.

### Posologie et mode d'administration

#### 1) Titration

Commencer par une unité dosée à 200 microgrammes. Par voie buccale transmuqueuse (le comprimé doit être placé contre la face interne de la joue puis grâce à l'applicateur le déplacer contre la muqueuse des joues)
↓
(Laisser fondre dans la bouche 1 unité d'Actiq® jusqu'à dissolution complète (15 minutes). Attendre encore 15 minutes supplémentaires. Si nécessaire, en cas d'analgésie insuffisante, prendre une seconde unité à laisser fondre en 15 minutes. Tester la même dose d'Actiq® lors de plusieurs accès douloureux paroxystiques consécutifs.
↓
Soulagement satisfaisant avec 1 unité ? si OUI : Dose efficace déterminée Si NON : Utiliser le dosage d'Actiq® immédiatement supérieur

#### 2) Traitement d'entretien

Les patients doivent utiliser la dose efficace établie et limiter leur **consommation à un maximum de 4 unités d'Actiq® par jour**. La dose d'entretien d'Actiq® doit être réajusté si le traitement de plusieurs accès douloureux paroxystiques consécutifs requiert plus d'un comprimé par accès et si les patients présentent plus de 4 accès douloureux paroxystiques par jour. Pour l'ajustement de la dose, les mêmes principes que ceux décrits pour la titration s'appliquent (voir ci-dessus). Tout réajustement de la posologie du traitement analgésique doit impérativement être surveillé par un professionnel de santé.

#### 3) Arrêt du traitement

Le traitement par Actiq® doit être immédiatement arrêté si le patient ne présente plus d'accès douloureux paroxystiques. Le traitement de la douleur chronique de fond doit être poursuivi conformément à la prescription. Si arrêt du traitement de fond le patient doit suivre le protocole d'arrêt progressif des morphiniques.



## Principaux effets indésirables

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Somnolence, vertiges, céphalées	Eviter de conduire
Difficultés respiratoires	Dyspnée très fréquente
Troubles digestifs	Mangez lentement. Faire plusieurs petits repas légers
Asthénie	Se reposer. Faire des exercices légers (marche)
Sécheresse buccale, caries	Bonne hygiène dentaire car Actiq contient du sucre.(peu fréquent)
Troubles de la vision	Vision trouble ou double fréquent

## Interactions médicamenteuses

Actiq® **interagit avec d'autres médicaments.** Notamment les sédatifs. Pendant le traitement, ne pas consommer de jus de pamplemousse ni d'alcool

Liste complète dans le Vidal

**Prise d'Actiq® à bien expliquer au patient et / ou fournir au patient la fiche Omédit Actiq® patient**

**Prendre Actiq® avant ou après un repas, mais pas pendant le repas**

## Grossesse

**Actiq® ne doit pas être pris lors de la grossesse et de l'allaitement.**

Si le médecin le juge indispensable, une prise **SOUS SURVEILLANCE** est possible pendant la grossesse, mais pas l'allaitement. L'allaitement ne doit pas être repris avant au moins 5 jours après la dernière administration de fentanyl.

## Conseils à donner aux patients

- ⚠ Le patient doit préciser à son médecin, la liste de ces médicaments avec ou sans ordonnance
- ⚠ Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien
- ⚠ Sportif : ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains **tests antidopage**
- ⚠ **Ne pas dépasser 4 unités d'Actiq® par jour.** Si 4 doses par jour ne suffisent pas, contactez le médecin
- ⚠ Actiq® peut induire une **somnolence**, augmentée par l'alcool ou des médicaments sédatifs. Il est déconseillé de conduire ou d'utiliser des machines dangereuses
- ⚠ Si l'accès douloureux paroxystique est terminé, n'utilisez pas ACTIQ® avant le prochain accès douloureux paroxystique.

## Contre-indications

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Patients ne recevant pas de traitement de fond morphinique, en raison d'un risque accru de dépression respiratoire.
- Traitement de la douleur aiguë autre que les accès douloureux paroxystiques.
- Administration concomitante ou interrompue depuis moins de 2 semaines d'inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (syndrome sérotoninergique)
- Dépression respiratoire sévère ou obstruction sévère des voies aériennes.