

Ne pas oublier de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne pas prendre de nouveaux médicaments sans en informer votre médecin ou votre pharmacien.



Eftrénonacog alfa (facteur IX)


ALPROLIX®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament **analogue du facteur IX** de la coagulation. Il est utilisé dans le **traitement et la prévention** des saignements chez les patients atteints **d'hémophilie B**.

Ce médicament doit être initialement prescrit par un médecin hospitalier. Sa délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières.

Dosages	Présentations
ALPROLIX® 250 UI	Chaque boîte contient : 1 flacon de poudre, 5 mL de solvant dans une seringue pré-remplie, l'ensemble du matériel nécessaire à la reconstitution et à la réalisation d'une injection.
ALPROLIX® 500 UI	
ALPROLIX® 1000 UI	
ALPROLIX® 2000 U	
ALPROLIX® 3000 UI	



Posologie Conseils de prise

Eftrénonacog alfa ALPROLIX®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Bien respecter la dose prescrite par votre médecin.

Après chaque injection, noter dans le carnet d'hémophile :

- La date de l'injection
- Le nom et numéro de lot du produit (utiliser les étiquettes décollables présentes sur le carton/flacon)
- Le nombre d'UI injectées, le motif de l'injection.

Quelques conseils



Toute décision de modification de dose ou d'arrêt du médicament doit être prise par le médecin du CRTH. Ne jamais prendre l'initiative seul.



En cas de voyage, partir avec :

- la carte d'hémophile
- le carnet de santé
- la carte de groupe sanguin
- l'ordonnance
- le carnet d'hémophile
- un certificat médical
- un courrier du médecin faisant référence au traitement par ALPROLIX®



Ne jamais arrêter votre traitement ni modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas d'oubli de s'injecter ALPROLIX® :

- Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.
- Prendre la dose oubliée dès que vous vous en souvenez, puis poursuivre le traitement comme d'habitude.
- En cas de doute, demander conseil au médecin, au pharmacien ou à l'infirmier/ère.



Le facteur IX (ALPROLIX®) ne doit être administré qu'en cas de nécessité absolue au cours de la grossesse et de l'allaitement.



Ne pas jeter les flacons vides et le matériel dans votre poubelle, mais plutôt dans les boîtes jaunes DASRI. Les rapporter avec les boîtes vides ensuite à votre pharmacien.

	Développement d'anticorps neutralisants le médicament	Des tests spécifiques seront réalisés pour détecter la présence éventuelle de ces inhibiteurs.
	Hypersensibilité, réactions allergiques	En cas d'apparition d'urticaire, hypotension, oppression thoracique, respiration sifflante, anaphylaxie, interrompre immédiatement le traitement et appeler le médecin.
	Maux de tête, fièvre	Prendre des antidouleurs si nécessaire.
	Autres : paresthésie buccale, uropathie obstructive	En cas d'apparition de ces symptômes ou de gêne au niveau urinaire, prévenir le médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**.



Consulter immédiatement le médecin ou appeler le SAMU en composant le 15 en cas :

- De difficulté à respirer
- De fortes démangeaisons
- De difficultés à arrêter un saignement

A conserver hors de portée des enfants.



Avant reconstitution

- à conserver au réfrigérateur
 - Conserver le flacon sans l'emballage extérieur d'origine
 - Eviter de le mettre dans la porte du réfrigérateur
- A température ambiante
 - Jusqu'à 6 mois
 - Ne pas remettre le produit au réfrigérateur

- Après reconstitution
→ utiliser immédiatement