



## Je suis ?

Type de structure	<b>CAS 1</b> Ets pivots (13)	<b>CAS 2 *</b> Ets sanitaire orientation gériatrique avec PUI	<b>CAS 3</b> Centres de vaccination	<b>CAS 4 **</b> Autres structures (ex Privés, SSR, dialyses, SDIS, FAM/MAS etc)	<b>CAS 5</b> EHPAD et USLD avec PUI	<b>CAS 6</b> Ets sans PUI dépendant d'une officine
-------------------	---------------------------------	--	--	---	--	---

## Je dépend de quel flux de livraison ?

Flux	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B**</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
------	----------	----------	----------	------------	----------	----------

## A qui doit-on passer la commande et sur quel support ?

Commande flacons @	ALLOCATION définie par SPF au niveau national Ventilation secondaire entre Ets par la région	Auprès de l'Ets PIVOT	Auprès de l'Ets de rattachement avec PUI	Auprès de l'Ets PIVOT**	Réalisée par	Support	Réalisée par	Site
					Ets de rattachement avec PUI		Officine	

## Comment calculer mes quantités : Quelles sont les personnes prioritaires que je peux vacciner ?

Quantités #	Cf les phases de priorisation de la vaccination → <b>Phases 1 et 2 en cours</b>	<b>Professionnels</b> → Vaccination dans les centres de vaccination, dans la limite des doses disponibles	<b>Patients</b> : Personnes âgées en établissements <b>Professionnels</b> : exerçant dans les établissements et présentant un risque élevé (plus de 50 ans ou présentant une ou des comorbidités)
----------------	---	---	--


## Qui doit me livrer ?

Livraison 1aire 2 / 8°C	 <b>-80°C</b> Fabricant	 2 / 8°C Ets pivot	 2 / 8°C Ets de rattachement	 2 / 8°C Ets pivot**		
----------------------------	---	--	--	--	--	--

## Pour qui sont destinées les doses reçues ?

Destinataires flacons reçus	Consommation propre + Ets rattachés		Consommation propre + Ets rattachés		Consommation propre	Consommation propre**	Consommation propre	Consommation propre
Livraison 2aire 2 / 8°C	Réalisée par	Destinataire	Réalisée par	Destinataire	Non concerné	Non concerné**	Non concerné	Non concerné
	Ets pivot	Ets rattachés	Ets avec PUI	Ets rattachés				

## Gestion des stocks et flacons restants ?

Suivi des stock	Flacons congelés		Pas de remontée des stocks pour flacons 2 / 8°C	Pas de remontée des stocks pour flacons 2 / 8°C	Pas de remontée des stocks pour flacons 2 / 8°C	Pas de remontée des stocks pour flacons 2 / 8°C	Pas de remontée des stocks pour flacons 2 / 8°C
Gestion des Flacons 2 / 8°C restants	Si et seulement si : flacons non ouverts et correctement conservés (entre 2° ET 8°C) → Proposer la vaccination à des publics considérées comme prioritaires tout en respectant le protocole vaccinal (consentement et visite médicale pré vaccinale).						

Ets = Etablissements

\* Sauf établissements en exception d'ores et déjà identifiées et approvisionnés par le CAS 6

\*\* Flux activé au cas par cas en fonction des stocks disponibles → se rapprocher du CH Pivot pour plus d'informations

Version 1 : 25/01/2021

Ce document sera mis à jour avec les dernières modifications de la chaîne d'approvisionnement

## PHASE 1

- Les résidents d'établissements accueillant des personnes âgées et les résidents en services de longs séjours (EHPAD, USLD ...)
- Les professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées (en premier lieu en EHPAD, USLD) présentant eux-mêmes un risque accru de forme grave/de décès (plus de 65 ans et/ou présence de comorbidité(s))

## PHASE 2

- Les personnes âgées de plus de 75 ans, en commençant par les plus âgées/présentant une ou plusieurs comorbidité(s)
- Puis les personnes âgées de 65-74 ans, en priorisant celles présentant une ou plusieurs comorbidité(s)
- Puis les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou présentant une ou plusieurs comorbidité(s) (quel que soit le mode d'exercice)

## PHASE 3

- Les personnes à risque du fait de leur âge (50-65 ans) ou de leur(s) comorbidité(s) non vaccinées antérieurement

## PHASE 4

- Les personnes vulnérables et précaires (sans domicile fixe...), vivant en collectivité (prisons, établissements psychiatriques, foyers...) non vaccinés antérieurement du fait de leur âge ou comorbidité
- Les professionnels prenant en charge les personnes vulnérables dont les travailleurs sociaux, non vaccinés antérieurement du fait de leur âge ou comorbidité(s)

## PHASE 5

- Autres tranches de la population susceptibles d'être infectées (18-50 ans) et non ciblées antérieurement