


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Informez l'ensemble des professionnels de santé en cas de prise d'AVK (Coumadine (Warfarine), Préviscan) ou de diurétique thiazidique (Indapamide, hydrochlorothiazide..), une adaptation de la posologie pourra être à prévoir**

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :  
.....  
.....  
Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :  
.....  
.....  
.....

Tél :  
.....  
.....

## Diazoxide

PROGLICEM®

### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un traitement de l'hypoglycémie chez l'adulte et l'enfant. Chez l'adulte, ce traitement sera indiqué en cas d'hypoglycémie par hyperinsulinisme d'origine pancréatique ou extra-pancréatique.

Il est prescrit par un médecin hospitalier.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières.

Il se présente sous forme de gélules à avaler avec un verre d'eau chez l'adulte. Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 6 ans, le contenu des gélules sera pris pendant le repas et sera mélangé avec les autres aliments.

Il existe 2 dosages :

- PROGLICEM® 25mg
- PROGLICEM® 100mg

# Posologie Conseils de prise

## Plan de prise

**Posologie:** La posologie initiale sera de 5 à 10 mg/kg/j. Celle-ci pourra être progressivement augmentée à 15 mg/kg/j chez l'enfant et le nouveau né.

La posologie sera progressivement adaptée par votre médecin.

**Mode d'administration:** Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Chez l'enfant de moins de 6 ans, mélanger le contenu des gélules avec l'alimentation.

**Durée du traitement:** La durée du traitement est variable selon chaque patient. En cas de traitement prolongé, un suivi clinique et biologique devra être effectué.



Conservez à température ambiante ne dépassant pas les 25°C.



Conservez hors de portée des enfants.

# Diazoxide PROGLICEM®

## Quelques conseils



Les gélules sont à avaler avec un verre d'eau chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.



Respecter la prescription médicale. En cas de doute, vérifiez la posologie auprès d'un professionnel de santé



Une surveillance clinique et biologique régulière ainsi qu'une consultation ophtalmique doivent être effectuées en cas de traitement prolongé



La prise du traitement est déconseillée en cas d'intolérance au lactose, galactose, un déficit en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose








En cas d'oubli, ne pas doubler la dose. Un surdosage peut entraîner des troubles digestifs et un risque d'hyperglycémie



Si vous envisagez une grossesse, parlez-en à votre médecin. L'allaitement est déconseillé.

# Principaux effets indésirables

	Nausées, vomissements	Ceci peut être important en début de traitement ou en cas d'augmentation de posologie. Parlez en à votre médecin.
	Rétention d'eau et sel se traduisant par des œdèmes, une prise de poids	Surveiller votre poids. Parlez en à votre médecin qui pourra vous prescrire un bilan sanguin régulier.
	Développement anormal et excessif du système pileux chez l'enfant	Parlez en à votre médecin.
Plus rarement: 	Eruptions cutanées, démangeaison	Parlez en à votre médecin.
Plus rarement: 	Trouble de la numération formule sanguine	En cas de fièvre, saignement de nez ou de gencive, infection parlez en à votre médecin

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;