


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Informez l'ensemble des professionnels de santé en cas de prise : d'antidépresseurs, d'antihypertenseurs, d'antibiotiques, de salbutamol (liste non exhaustive), une adaptation de la posologie ou une surveillance pourra être à prévoir

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :
.....
.....
Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :
.....
.....
.....

Tél :
.....
.....

Atomoxétine

STRATTERA®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité chez les enfants de plus de 6 ans, les adolescents et les adultes.

Il est prescrit par un médecin hospitalier, spécialiste en neurologie, psychiatrie ou pédiatrie.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, sur présentation de votre ordonnance.

Il se présente sous forme de gélules à avaler avec un verre d'eau.

Il existe 5 dosages :

- STRATTERA® 10 mg
- STRATTERA® 18 mg
- STRATTERA® 25 mg
- STRATTERA® 40 mg
- STRATTERA® 60 mg

Posologie Conseils de prise

Atomoxétine STRATTERA®

Principaux effets indésirables

Plan de prise

Posologie:

- Pour un enfant (6 ans et plus) et pour un adolescent: la dose à prendre est calculée par le médecin. La dose est augmentée progressivement jusqu'à une posologie de maintien.
- Pour un adulte: la dose initiale est de 40 mg/jour pendant au moins 7 jours. Le médecin peut ensuite décider d'augmenter la dose à 80-100 mg/jour (dose de maintien).

Mode d'administration : la dose prescrite est à prendre en 1 voire 2 prises par jour (matin et fin d'après-midi/soirée), toujours à la même heure. Les gélules sont à avaler entières avec de l'eau, avec ou sans nourriture.

Ne pas ouvrir les gélules !



Conservez à température ambiante ne dépassant pas les 25°C.



Conservez hors de portée des enfants.

Quelques conseils



Respecter la prescription médicale. En cas de doute, vérifiez la posologie auprès d'un professionnel de santé.



Si vous avez : un glaucome à angle fermé, des problèmes cardiaques pouvant augmenter la fréquence cardiaque ou la pression artérielle, un antécédent d'accident vasculaire cérébral ischémique, un phéochromocytome, des idées suicidaires, des problèmes au foie, des antécédents d'épilepsie ou de convulsions, parlez-en à votre médecin.



Une surveillance clinique doit être effectuée.



Si vous oubliez de prendre une dose, prenez la dose oubliée, dès que possible, sans jamais dépasser la dose prescrite journalière.



Si vous prenez plus de STRATTERA que vous auriez dû prendre, contactez votre médecin.



Si vous envisagez une grossesse, parlez-en à votre médecin. L'allaitement est déconseillé.



Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;

	Eruption cutanée Démangeaisons	Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers.
	Nausées, vomissements, perte d'appétit	Fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Buvez surtout entre les repas (les boissons gazeuses fraîches aident à diminuer les nausées). Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Ne vous allongez pas dans les 30 min suivant un repas. En cas de vomissements, utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits.
	Constipation	Buvez au moins 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (son, céréales, pain complet, légumes verts, fruits et fruits secs). Pratiquez une activité physique régulière. Surveillez la reprise du transit. En cas de constipation avec de fortes douleurs abdominales et de la fièvre, consultez votre médecin.
	Maux de tête	Privilégiez une alimentation saine et à horaires réguliers. Limitez l'usage de psychostimulants tels que café, tabac et alcool. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée ; couchez-vous à heure régulière. Soyez prudent en cas de conduite automobile.