

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.
- Vous devez signaler ce traitement lors d'une consultation chez un nouveau médecin.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.

Informez l'ensemble des professionnels de santé en cas de prise :



Fidaxomicine +
Amiodarone, Ciclosporine,
Clarithromycine, Dronédarone
Erythromycine, Kétoconazole
Vérapamil

Une adaptation de la posologie ou une surveillance pourra être à prévoir

L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....
.....
.....

Tél :

.....
.....

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Fidaxomicine

DIFICLIR®

- 20 x 1 comprimé pelliculé sous plaquettes thermoformées.



À quoi sert ce médicament ?

- Ce médicament est un antibiotique Indiqué dans les cas suivants :
Diarrhée à Clostridioides difficile (anciennement Clostridium difficile)
 - Ce médicament est disponible **uniquement dans les pharmacies hospitalières** autorisées à la rétrocession (vente au public)



Conseils de prise

Effets indésirables

Comment prendre votre médicament ?

Dose = 2 comprimés par jour

Une période de 10 j est nécessaire pour évaluer l'efficacité de ce traitement.

Respecter un intervalle de 12 heures entre 2 prises.

Les comprimés sont à prendre indépendamment de la prise des repas avec une quantité suffisante d'eau.

Que faire en cas d'oubli d'une dose ?

Si une dose a été oubliée, elle doit être prise dès que possible ou, s'il est presque temps de prendre la dose suivante, le comprimé oublié ne doit pas être pris.

Ne doublez jamais la dose.




A conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité

A conserver hors de portée des enfants



Ne pas utiliser après la date de péremption

Quelques conseils



N'arrêtez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin : risque d'effets indésirables graves

Effet indésirable		Que dois je faire?
	Maux de tête	Si la douleur est trop importante parlez-en à votre médecin.
	Vertiges, hypotension	Pour diminuer les vertiges, évitez de vous lever trop brusquement ou asseyez-vous.
	Constipation, sécheresse de la bouche	Buvez beaucoup d'eau. Adoptez un régime à base de fibres (légumes verts, fruits...).
	œdème	Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. En cas de prise de poids rapide, informez -en votre médecin

	Eruption cutanée Démangeaisons	Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers.
	Nausées, vomissements, perte d'appétit	Fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Buvez surtout entre les repas (les boissons gazeuses fraîches aident à diminuer les nausées). Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Ne vous allongez pas dans les 30 min suivant un repas. En cas de vomissements, utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits.

Les effets indésirables (EI) peuvent ne jamais apparaître et sont différents d'une personne à une autre. Les EI, en grande majorité, ne sont pas graves. Certains régressent dès la première semaine de traitement.

Il faut les connaître pour pouvoir les identifier et les éviter. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin qui recherchera une solution pour les atténuer, voire les faire disparaître.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés sur cette fiche, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.