

# Altrétamine

HEXASTAT<sup>®</sup>

FICHE  
CONSEIL  
Professionnel

## Présentation et caractéristiques

HEXASTAT<sup>®</sup> un agent alkylant.

**Présentation** : gélules de 100 mg (violette transparentes). Présenté par boîte de 25, en blister de 5 gélules.

### Caractéristiques :

- A conserver dans l'emballage d'origine, à température ambiante, sans dépasser 25°C.
- Médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, en rétrocession.

## Indications

- Traitement de deuxième ligne du cancer de l'ovaire et du cancer bronchique à petites cellules.

## Posologie et mode d'administration

### Posologie recommandée:

En 2 ou 3 prises quotidiennes

Après les repas et avant le coucher.

**En monothérapie : 260 mg/m<sup>2</sup> par jour, pendant 14 à 21 jours consécutifs. A répéter tous les 28 jours**

**En association : la dose utilisée en monothérapie peut être diminuée en fonction de l'association avec un ou plusieurs cytostatiques ou cytolytiques. Habituellement 150 mg/m<sup>2</sup>/j, pendant 8 à 14 jours. A répéter tous les 28 jours**

## Grossesse, allaitement

Ne pas prendre HEXASTAT<sup>®</sup> en cas de grossesse et d'allaitement. Pour les femmes en âge de procréer et pour les hommes traités par HEXASTAT<sup>®</sup>, une méthode de contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.

## Principaux effets indésirables et suivi de traitement

| Effets secondaires                    | Prévention et conduite à tenir  |
|---------------------------------------|---|
| Anémie, leucopénie, thrombopénie      | Surveillance hématologique avant et après chaque cure.<br>Réversible en 1 à 2 semaines : voir avec l'oncologue pour un éventuel report du prochain cycle.   |
| Nausées vomissements                  | Boire entre les repas, faire plusieurs petits repas légers.<br>Évitez les aliments gras, frits, épicés.<br>Un protocole antiémétique est recommandé. L'association d'un sédatif léger est recommandée si la prise se fait au coucher.   |
| diarrhée                              | Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.<br>Boire au moins 2L d'eau par jour et privilégiez les féculents, les carottes, les bananes.<br>Traitement symptomatique en complément d'une réhydratation orale.     |
| Troubles neurologiques                | Fréquents si utilisation prolongée.<br>Un bilan neurologique régulier est recommandé.<br>Réversibles : arrêt possible pendant 15 jours et reprise à dose réduite à voir avec l'oncologue.<br>La pyridoxine (Vit B6) est déconseillée.<br>Prudence en cas de conduite de véhicule. |
| Allergie, rash cutané, prurit, eczéma | Utilisation d'antihistaminiques   |
| autres                                | Alopécie réversible<br>Aménorrhée et azoospermie peuvent survenir   |

## Interactions médicamenteuses


Association contre-indiquée : vaccin contre la fièvre jaune (risque de maladie vaccinale généralisée mortelle).


phénytoïne à visée prophylactique, décrit pour doxorubicine, daunorubicine, carboplatine, cisplatine, carmustine, vincristine, vinblastine, bléomycine, méthotrexate : risque de survenue de convulsions par diminution de l'absorption digestive de la phénytoïne par le cytotoxique.

Association déconseillée : vaccins vivants atténués.  
Pour les vaccins inactivés, il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie (risque de diminution de l'activité du vaccin sans augmentation de l'effet indésirable).


A prendre en compte : ciclosporine, tacrolimus, les anticoagulants ...


## Conseils à donner aux patients


 Les gélules sont à prendre par voie orale avec un grand verre d'eau, après les repas et avant le coucher. En général, 3 à 4 prises par jour.  
Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ni mâchées.


 Se laver soigneusement les mains avant et après la manipulation des gélules.

 Ne pas laisser à la portée des enfants.

 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.

 Conseiller aux hommes d'uriner en position assise pour éviter toute contamination accidentelle.

 en cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissements...), les laver immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).

 **Si une prise a été oubliée**, la dose manquée ne doit pas être rattrapée. Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.

 **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**

 **Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de :**

- Signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence.
- Apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang.
- Troubles neurologiques (paresthésie, hallucinations, dépression, somnolences ou insomnies)

Pour une information complète, se reporter au RCP.

