

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Bicalutamide

CASODEX®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancers de la prostate.


Il est prescrit par un médecin hospitalier ou de ville.

Il est disponible en pharmacie de ville.

Il est présenté par boîte de 30 comprimés blancs.


Il n'existe qu'un seul dosage:

- CASODEX® 50mg



Posologie Conseils de prise

Plan de prise



La dose recommandée est strictement personnelle. Selon l'indication, elle peut être de 50 ou de 150 mg par jour.



Conservez hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.



Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Difficulté à respirer ou de toux anormale
- Démangeaisons, douleurs abdominales, urines foncées

Bicalutamide CASODEX®

Quelques conseils



Prendre les comprimés avec un grand verre d'eau, avec ou sans aliments. Ils peuvent se prendre le matin ou le soir, mais **toujours au même moment de la journée**



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du comprimé.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Evitez de boire de l'alcool pendant le traitement



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise, ne pas prendre celle manquée. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et notez cet oubli dans le carnet de suivi.



Les patients ou leurs partenaires en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et pendant 130 jours après l'arrêt du traitement.

Principaux effets indésirables

	Bouffées de chaleur	Evitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur. Faites des exercices légers (marche). Restez au frais. Portez des vêtements légers. Buvez régulièrement de l'eau.
	Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez de manger des aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. Si les symptômes sont persistants, parlez-en à votre médecin.
	Constipation	Privilégiez une bonne hydratation et une activité physique régulière. Boire au moins 2 litres d'eau par jour.
	Vertiges, somnolences	Attention lors de l'utilisation de véhicules et de machines
	Autres	Gonflement et douleurs dans la poitrine. Eruptions cutanées Troubles de l'humeur.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**