

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Létrozole

FEMARA®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancer du sein.

Il est prescrit par un médecin hospitalier ou de ville


Il est disponible en pharmacie de ville.

Il s'agit de comprimés jaunes foncés.

Il est présenté par boîtes de 30 comprimés, sous plaquettes thermoformées.

Il n'existe qu'un seul dosage :

- FEMARA® 2,5 mg



Posologie Conseils de prise

Plan de prise

La dose recommandée est de 2,5mg en une prise quotidienne.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de l'humidité, à une température ne dépassant pas 30°C

Contactez rapidement votre médecin en cas de:

- Prise de poids rapide et inattendue
- Saignement vaginal important

Létrozole FEMARA®

Quelques conseils



FEMARA peut être pris au cours ou en dehors d'un repas. Il peut se prendre à n'importe quel moment de la journée avec un grand verre d'eau.



Ne pas broyer les comprimés.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du comprimé. Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise, prenez immédiatement la prise oubliée sauf si la prise suivante est prévue dans moins de 3h. Reprenez ensuite votre schéma posologique habituel,



Ce traitement ne doit être pris que lorsque la ménopause est clairement confirmée.

Principaux effets indésirables

	Bouffées de chaleur, transpiration excessive	Évitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress, la chaleur. Buvez régulièrement. Restez au frais, Portez des vêtements légers.
	Maux de tête, fatigue	Faites de l'exercice léger (marche). Prudence en cas de conduite de véhicule. Antalgiques si nécessaire (paracétamol).
	Nausées vomissements	Buvez entre les repas. Évitez de manger des aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Si les symptômes persistent, parlez-en à votre médecin
	Constipation	Privilégiez une bonne hydratation et une activité physique régulière. Buvez au moins 2L d'eau par jour.
	Diarrhées	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus et l'alcool. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour et privilégiez les féculents.
	Œdèmes périphériques	Surveillez votre poids et contactez votre médecin en cas de prise de poids rapide et inattendue.
	Risque accru d'ostéoporose	Ostéodensitométrie au début du traitement chez les femmes à risque d'ostéoporose. Un traitement spécifique peut être nécessaire.
	Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant pour soulager les symptômes. Évitez l'exposition au soleil.
	Autres	Alopécie Hémorragies vaginales ou utérines Hypercholestérolémie arthralgies