

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Il faut par exemple **éviter la prise de millepertuis** sous toutes ses formes (gélule, tisane, goutte...)

N'oubliez pas de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.

Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Vénétoclax

VENCLYXTO®

À quoi sert ce médicament ?


Ce médicament est utilisé dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique.

Ce médicament doit être prescrit par une **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible dans les pharmacies de ville en commande directe auprès du laboratoire ABBVIE.

Trois dosages sont disponibles sous forme de comprimés pelliculés :

- VENCLYXTO® 10 mg
- VENCLYXTO® 50 mg
- VENCLYXTO® 100 mg



Posologie Conseils de prise

Vénétoclax
VENCLYXTO®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



La dose est augmentée progressivement sur 5 semaines :

Semaine 1 : 20mg/j en 1 prise par jour pendant 7 jours

Semaine 2 : 50mg/j en 1 prise par jour pendant 7 jours

Semaine 3 : 100mg/j en 1 prise par jour pendant 7 jours

Semaine 4 : 200mg/j en 1 prise par jour pendant 7 jours

Semaine 5 et suivantes : 400mg/j en 1 prise par jour pendant 7 jours



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à température ambiante (inférieure à 25°C), à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.



Consultez immédiatement votre médecin en cas de :

- Difficulté à respirer, toux anormale, essoufflement
- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons)
- Palpitations

Quelques conseils



Les comprimés de Venclyxto® doivent être avalés entiers (ne pas les écraser ni les mâcher), avec un verre d'eau, au cours des repas, à heure fixe.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.







Oubli de prise d'un comprimé de Venclyxto® :

- En cas d'oubli d'une prise de moins de 8 heures, prenez la dose.
- En cas d'oubli d'une prise de plus de 8 heures, ne prenez pas la dose oubliée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.



Il ne faut pas prendre Venclyxto® pendant la grossesse ou l'allaitement. Une méthode efficace de contraception doit être instaurée pendant toute la durée du traitement et être poursuivie pendant au moins 1 mois après l'arrêt du traitement pour les femmes. Une contraception mécanique (préservatifs) doit être associée à la contraception hormonale.

	Diarrhées	A éviter : café, boissons glacées, lait, fruits, légumes crus, céréales, pain complet, alcool. A privilégier : féculents, carottes, bananes Buvez au moins 2 L par jour
	Nausées vomissements	A éviter : aliments frits, gras ou épicés En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 h avant de manger Conseil : Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers et buvez entre les repas
	Constipation	Privilégiez une bonne hydratation et une activité physique régulière. Buvez au moins 2L d'eau par jour
	Modification du bilan sanguin	Effectuez régulièrement les bilans sanguins prescrits (résultats à communiquer à votre médecin). Si signes infectieux (fièvre, toux) ou saignements inhabituels, prévenez votre médecin.
	Infections respiratoires et urinaires	Limitez les contacts ayant une infection contagieuse Lavez-vous les mains
	Fatigue	Repos fréquent, gardez une bonne hygiène de vie, pratiquez un exercice physique modéré Prudence en cas de conduite de véhicule

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien