

Pipobroman

VERCYTE®

FICHE
CONSEIL
Professionnel

Présentation et caractéristiques

VERCYTE® est un agent alkylant.

Présentation : comprimés blancs de 25 mg. Présentés par boîte de 30 comprimés, sous plaquettes thermoformées.

Caractéristiques :

- A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Médicament pouvant être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (liste I).
- Il est disponible dans les pharmacies de ville et remboursé à 100% par la SS.

Indications

- Traitement de la polyglobulie primitive (maladie de Vasquez) chez les patients intolérants ou réfractaires à l'hydroxycarbamide.

Posologie et mode d'administration

Traitement d'attaque :

1 mg/kg/jour, soit 2 à 3 comprimés en **prises fractionnées**.

(Si au bout d'un mois de traitement d'attaque à 1 mg/kg/j on n'obtient pas une réponse hématologique satisfaisante, on peut passer à des doses de 1,5 à 3 mg/kg/j, sous couvert d'une surveillance hématologique stricte.)

Traitement d'entretien :

Celui-ci est habituellement entrepris lorsque l'hématocrite a été ramené à 50-55 %.

La dose quotidienne sera alors de 0,1 à 0,2 mg/kg.

VERCYTE doit être utilisé avec précaution chez les patients récemment traités par radiothérapie ou par chimiothérapie cytostatique (risque de majoration de l'effet cytopéniant)

Grossesse, allaitement

Ne pas prendre VERCYTE® en cas de grossesse et d'allaitement. Utiliser un moyen de contraception efficace.

Principaux effets indésirables et suivi de traitement

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Nausées/ vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers. Traitement antiémétique standard éventuel.
Diarrhée	Eviter le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. Traitement symptomatique en complément d'une réhydratation orale.
Allergie : rash cutanés	Utiliser un savon doux et un agent hydratant. Eviter les expositions au soleil.
Modification du bilan sanguin	Surveillance hématologique : myélogramme et hémogramme avant le début du traitement, puis hémogramme deux fois par semaine. Une anémie dose-dépendante a été fréquemment rapportée, qui disparaîtra, en général, avec de petites transfusions de sang et la réduction de la posologie. Une chute du taux d'hémoglobine, une augmentation de la bilirubinémie, une réticulocytose feront arrêter le traitement. Un traitement ne peut être débuté ou poursuivi si le nombre de leucocytes est inférieur à 3000/mm ³ et le nombre de plaquettes supérieur à 150 000/mm ³

Interactions médicamenteuses

Contre-indication :

- avec le vaccin contre la fièvre jaune.
- avec un autre antinéoplasique et une radiothérapie.


Déconseillé :


- Avec un vaccin vivant atténué
- avec la phénytoïne : risque de survenue de convulsion par diminution de l'absorption digestive de la seule phénytoïne par le cytotoxique, ou bien risque de majoration de la toxicité ou de perte d'efficacité du cytotoxique par augmentation de son métabolisme hépatique par la phénytoïne ou de la fosphénytoïne

Précaution avec les AVK : contrôle plus fréquent de l'INR, et avec d'autres immunosuppresseurs.


Pour les vaccins inactivés, il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie (risque de diminution de l'activité du vaccin sans augmentation des effets indésirables).

Conseils à donner aux patients


 VERCYTE® doit être pris avec un grand verre d'eau indifféremment pendant ou en dehors des repas.


 Se laver soigneusement les mains avant et après la manipulation des comprimés.

 Ne pas laisser à la portée des enfants.

 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.

 Conseiller aux hommes d'uriner en position assise.

 En cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissures...), les laver immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).

 Si une prise a été oubliée, **le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante**. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.

 **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**

 **Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de :**

- Signes infectieux pour réaliser une NFS
- Apparition de selles noires, de saignements de nez et de crachats comportant du sang.

Pour une information complète, se reporter au RCP.