

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.**



## Sorafénib

NEXAVAR®

### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancer du foie, du rein et de la thyroïde.


Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible dans les pharmacies de ville.

Il est présenté par boîtes de 112 comprimés pelliculés ronds et rouges, sous plaquettes thermoformées.

Il n'existe qu'un seul dosage:

- NEXAVAR® 200 mg



# Posologie Conseils de prise

**Sorafénib**  
NEXAVAR®

# Principaux effets indésirables

## Plan de prise

La dose est strictement personnelle. La dose habituelle chez l'adulte est de **2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir**, c'est-à-dire 4 comprimés par jour.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à température ambiante, ne dépassant pas 25°C.

## Quelques conseils



Il est recommandé d'administrer, avec un verre d'eau, le NEXAVAR® en dehors des repas ou avec un repas pauvre en graisses. En cas de repas riche en graisses, les comprimés doivent être pris au moins 1 heure avant ou 2 heures après le repas.



Respecter un intervalle de 12 heures entre la prise du matin et celle du soir.



Eviter les médicaments **utilisés pour traiter les brûlures d'estomac**.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rappelez-les à votre pharmacien.



**N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**



**Si vous avez oublié une prise**, prenez la dose suivante à l'heure habituelle mais ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée. Notez cet oubli dans le carnet de suivi



Ne pas prendre en cas de grossesse ou d'allaitement. Utilisez une contraception efficace.

**Contactez rapidement votre médecin** en cas de:

- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons...)
- Apparition de selles noires, de saignements de nez et de crachats comportant du sang
- Gonflement, rougeur et douleur de la paume des mains et de la plante des pieds
- Douleur thoracique, en particulier si elle survient pendant un exercice.

	Diarrhées et constipation	<u>Diarrhée</u> : Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Buvez au moins 2L/j et privilégiez les féculents, les carottes, bananes. <u>Constipation</u> : boire, alimentation riche en fibres et activité physique régulière.
	Nausées vomissements	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers. En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenez le médecin.
	Rougeurs, démangeaisons	Utilisez une crème hydratante. Portez des vêtements amples. Evitez les expositions au soleil. Informez votre médecin.
	Picotements, gonflements, rougeurs voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Contactez immédiatement votre médecin. Evitez le soleil et toute exposition à la chaleur. Evitez les vêtements et les chaussures trop serrés. Utilisez un savon doux sans parfum. Evitez les travaux irritants pour les mains. Evitez la station debout et les marches prolongées. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche. Appliquez des crèmes hydratantes (voir avec votre médecin).
	Hypertension artérielle	Vérifiez régulièrement votre tension. Consultez votre médecin en cas d'élévation de la tension.
	Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez le médecin en cas de signes infectieux.
	Saignements (diminution des plaquettes)	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en pinçant vos narines.
	Fatigue inhabituelle	Repos, exercices légers. En cas de fatigue persistante, informez votre médecin.
	Autres	Réaction allergique, hypo/hyperthyroïdie, troubles sensitifs, perte de cheveux.