

Torémifène

FARESTON®

FICHE CONSEIL Professionnel

Présentation et caractéristiques

FARESTON® est un anti-estrogène agissant par inhibition compétitive de la liaison de l'œstradiol avec ses récepteurs.

Présentation : comprimé de 60 mg.

Caractéristiques :

- A conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de l'humidité, à une température ne dépassant pas 30°C et hors de la portée des enfants.
- Médicament qui peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville. Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.
- Médicament remboursé à 100% par la sécurité sociale.

Indications

- Traitement hormonal de première intention du cancer métastatique du sein hormono-sensible de la femme ménopausée.

Il est nécessaire de déterminer auparavant, les taux de récepteurs aux œstrogènes dans la tumeur et ses métastases. Il n'est pas recommandé chez les patientes dont les tumeurs n'ont pas de récepteurs aux œstrogènes.

Contre-indications

- Antécédents thromboemboliques sévères,
- Anomalie du rythme cardiaque incompatible avec le risque de survenue d'allongement de l'espace QT,
- Insuffisance hépatique sévère

Posologie et mode d'administration

Posologie recommandée: 60 mg par jour	Par voie orale En une prise quotidienne
--	--

Grossesse, allaitement

Ce traitement est réservé à la femme ménopausée.

Principaux effets indésirables et suivi de traitement

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Nausées/ vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers. Traitement anti émétique standard éventuel
Bouffées de chaleur	Eviter les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur. Bien s'hydrater, rester au frais, porter des vêtements légers.
Œdème des membres	Surveillance du poids. Prudence en cas d'insuffisance cardiaque décompensée, d'angor, de diabète mal contrôlé. En cas de prise de poids rapide et inattendue, mise en place d'un traitement symptomatique (diurétiques).
Fatigue, étourdissements, vertiges	Repos fréquent. Prudence en cas de conduite de véhicule.
autres	Leucorrhées, saignements vaginaux Surveiller la calcémie en cas de métastases osseuses Manifestations thromboemboliques possibles.


Interactions médicamenteuses


Il est contre-indiqué de co-administrer FARESTON avec des médicaments provoquant un allongement de l'intervalle QT (antiarythmiques de classe Ia et III, neuroleptiques, certains antimicrobiens, certains anti-histaminiques.


Il est recommandé d'utiliser avec précaution :


- les diurétiques thiazidiques qui peuvent augmenter l'hypercalcémie
- les inducteurs et inhibiteurs du CYP3A4
- les anticoagulants du type warfarine, entraînant un allongement important du temps de saignement.


Conseils à donner aux patients

 Les comprimés peuvent être pris au cours ou en dehors des repas, en une prise par jour, avec un grand verre d'eau.


 Se laver soigneusement les mains avant et après la manipulation des gélules.

 Ne pas laisser à la portée des enfants.

 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.

 **Si une prise a été oubliée, la dose manquée ne doit pas être rattrapée. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.**

 **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**

 **Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de :**

- prise de poids inattendue
- saignement vaginal important
- gonflements et/ou douleur au niveau d'un membre, difficulté à respirer (manifestations thromboemboliques)

Pour une information complète, se reporter au RCP.