

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.


Il faut par exemple **éviter la prise de millepertuis** sous toutes ses formes (gélule, tisane, goutte...)

N'oubliez pas de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.

Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Tramétinib

MEKINIST®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé en dernière ligne dans le traitement du cancer colorectal métastatique ou certaines formes de cancer du poumon.

Ce médicament doit être prescrit par une **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible dans les **pharmacies de ville** et dans **les pharmacies hospitalières**.

Deux dosages sont disponibles sous la forme de flacons de 30 comprimés pelliculés :

- MEKINIST® 0,5 mg
- MEKINIST® 2 mg

Posologie Conseils de prise

Tramétinib MEKINIST®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



La posologie est strictement personnelle et vous sera expliquée par votre médecin.

La posologie usuelle du Mékinist® est de **2 mg en une prise orale journalière unique, sans nourriture au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas, à heure fixe.**

Essayez de les prendre chaque jour à la même heure et au même moment que le TAFINLAR® dabrafenib en cas d'association.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à une température entre +2°C et +8°C, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

Après ouverture, flacon à conserver 30 jours à une température inférieure à 30°C.



Arrêtez de prendre Mékinist® et consultez immédiatement votre médecin en cas de :

- Difficulté à respirer, toux anormale, essoufflement
- Palpitations

Quelques conseils



Les comprimés de Mékinist® doivent être avalés entiers (ni écrasés, ni coupés, ni mâchés ou croqués), **sans nourriture au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas, à heure fixe.**



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre votre comprimé de Mékinist®, 2 cas se présentent :

- ❖ En cas d'oubli d'une prise **de moins de 12 heures**, prenez la dose.
- ❖ En cas d'oubli d'une prise **de plus de 12 heures**, ne prenez pas la dose oubliée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.



Le Mékinist® est déconseillé **pendant la grossesse ou l'allaitement.** Une **méthode efficace de contraception** doit être instaurée pendant toute la durée du traitement et être poursuivie pendant au moins 4 mois après l'arrêt du traitement.

	Diarrhées	<u>A éviter</u> : café, boissons glacées, lait, fruits, légumes crus, céréales, pain complet, alcool. <u>A privilégier</u> : féculents, carottes, bananes Buvez au moins 2 L par jour
	Nausées vomissements	Buvez entre les repas. Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers. <u>A éviter</u> : aliments frits, gras ou épicés En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 h avant de manger
	Eruption cutanée Sécheresse de la peau	Utiliser un savon doux sans parfum et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil et utilisez une protection solaire (chapeau, écran total). Si les symptômes persistent contacter votre médecin.
	Modification du bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin. En cas de doute, prenez votre température. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenez votre médecin.
	Douleur articulaire et musculaire	Reposez-vous. Pratiquez des exercices légers. Evitez les gestes répétitifs et les efforts physiques importants.
	Toux Difficulté à respirer	Limitez les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez vous souvent les mains. Prévenez immédiatement votre médecin si ces signes apparaissent

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien ;