

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.**



## Vinorelbine

NAVELBINE ORAL®

### À quoi sert ce médicament ?


Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancer du poumon et du sein.

Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie.  
Il est disponible en pharmacie de ville.

Présenté par boîte d'une capsule molle.

Il existe 2 dosages:

- NAVELBINE ORAL® 20mg (capsule molle marron clair)
- NAVELBINE ORAL® 30 mg (capsule molle rose)



# Posologie Conseils de prise

## Plan de prise



La dose est strictement personnelle. L'administration se fait en **une prise unique par semaine et à jour fixe**.

Pour ouvrir le conditionnement sécurisé :

(1) découpez la plaquette avec des ciseaux en suivant le trait noir;

(2) pelez doucement le film blanc qui recouvre la plaquette;

(3) appuyez sur le plastique transparent pour expulser la capsule au travers du feuillet d'aluminium : vous pouvez ainsi l'introduire directement dans votre bouche pour ensuite l'avalier à l'aide d'un verre d'eau.

**Ne pas utiliser si vous constatez un écrasement ou une fuite du liquide de la capsule.**



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver dans le conditionnement d'origine soigneusement fermé, entre +2 et +8°C (au réfrigérateur) . Prévoir un sac isotherme pour le transport)



**Contactez rapidement votre médecin** en cas de :

- Signe infectieux (fièvre, toux, frissons...)
- Difficultés à respirer
- Fourmillements ou picotements des mains ou des pieds.

# Vinorelbine NAVELBINE ORAL®

## Quelques conseils



La capsule molle doit être avalée avec de l'eau, sans être mâchée ni sucée. Il est recommandé de prendre les capsules à la fin d'un repas léger.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des capsules. (surtout si un contact se produit avec le contenu de la capsule, rincez abondamment les parties du corps touchées et contactez le médecin).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



**N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration** sans avis du prescripteur. En cas de vomissement, ne jamais répéter l'administration de cette dose.



**Si vous avez oublié une prise**, prenez la dose oubliée le jour suivant sans la doubler. Notez cet oubli dans le carnet de suivi et en informer votre médecin. La prise des semaines suivantes devra être décalée d'une journée.



Ne pas prendre NAVELBINE® en cas de grossesse et d'allaitement. Pour les femmes et pour les hommes traités par NAVELBINE®, une méthode de contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.

# Principaux effets indésirables

	Diarrhées	<u>A éviter</u> : café, boissons glacées, lait, fruits, légumes crus, céréales, pain complet, alcool. <u>A privilégier</u> : féculents, carottes, bananes Buvez au moins 2 L par jour.
	Nausées vomissements	<u>A éviter</u> : aliments frits, gras ou épicés. En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 h avant de manger <u>Conseil</u> : Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers et buvez entre les repas
	Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière (marche).
	Douleurs dans la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. Humidifiez la bouche avec un vaporisateur.
	Modification du bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être effectué avant chaque administration et les résultats communiqués à votre médecin. Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
	Fatigue	Attention lors d'utilisation de véhicules ou de machines.
	Autres	Perte de cheveux, généralement rare et incomplète Troubles neurologiques

**Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.**

**Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;**