

Nitazoxanide

ALINIA®

Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominativeMédicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocéderable, sans restriction de prescripteurs

Présentation et caractéristiques

Anti-infectieux antiprotozoaire

Présentations :

- Comprimé de 500mg (flacons de 30 cpr)

Excipients : Amidon de maïs, amidon pré-gélatinisé, saccharose, hydroxypropylméthylcellulose, amidon glycolate sodique, talc, magnésium stéarate, lécithine de soja, alcool polyvinylique, gomme xanthane, dioxyde de titane, laque

- Poudre pour suspension buvable 100mg/5mL (flacon de 60mL après reconstitution)

Excipients : Benzoate de sodium, saccharose, gomme xanthane, cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de sodium, acide citrique anhydre, citrate de sodium dihydraté, maltodextrine, amidon alimentaire modifié, triacétine, arôme fraise

Caractéristiques :

- Conservation à T° ambiante entre 15 et 30°C
- Poudre pour suspension buvable : reconstitution avec 48mL d'eau (ajouter d'abord 24mL, agiter jusqu'à dissolution complète puis compléter avec les autres 24mL et agiter à nouveau) : la solution obtenue est de couleur rose et goût fraise. Après reconstitution : conservation à T° ambiante max 7 jours.

Indications

- Diarrhées causées par *Cryptosporidium parvum* ou *Giardia lamblia* chez les adultes et les enfants > 1 an

Posologie et mode d'administration

<u>De 1 à 3 ans</u>	5mL (100mg) toutes les 12 heures
<u>De 4 à 11 ans</u>	10mL (200mg) toutes les 12 heures
<u>≥ 12 ans</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 comprimé de 500mg toutes les 12 heures <li style="text-align: center;">ou ▶ 25mL (500mg) toutes les 12 heures

- ▶ 2 prises quotidiennes espacées de 12 heures
- ▶ Durée du traitement : 3 jours
- ▶ A prendre avec de la nourriture
- ▶ Pour la suspension buvable : agiter le flacon avant chaque administration

Interactions médicamenteuses

- Médicaments susceptibles d'entrer en compétition avec la liaison aux protéines plasmatiques du métabolite actif (tizoxanide) : AVK, sulfamides, diurétiques de l'anse, anti-épileptiques...

Principaux effets indésirables

- Douleurs abdominales, diarrhées, nausées
- Céphalées


Contre-indications


- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients


Précautions d'emploi


- Insuffisance rénale ou hépatique (pas de données)
- Diabète (présence de saccharose)
- Patients < 1 an (pas de données)
- Grossesse, allaitement
- Infection VIH

Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Alinia® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

