

Tiopronine

CAPTIMER®

Conditions de prescription et de délivrance :

Ce médicament est importé suite à l'arrêt de commercialisation d'ACADIONE (Tiopronine). Il n'y a pas de restriction de prescription.

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières**.

Présentation et caractéristiques

CAPTIMER se présente sous la forme d'une boîte contenant un **flacon de 100 comprimés à 250 mg** (comprimés blancs).

Conserver ce médicament dans l'emballage extérieur d'origine, à **température ambiante**.

Indications et mécanisme d'action

CAPTIMER est indiqué dans le **traitement de la cystinurie et de la lithiase cystinique en cas d'intolérance à la D-pénicillamine**.

La thiopronine possède grâce à sa fonction thiol, une action litholytique. Elle permet la solubilisation ou la prévention de la formation des calculs rénaux de L-cystine, par la formation d'un dérivé disulfure tiopronine cystéine soluble.

Posologie et mode d'administration

La posologie est toujours adaptée en fonction de l'état clinique du patient et de ses résultats biologiques. Elle est également variable selon le poids du patient.

Dose max : 2000 mg par jour.

- Enfant de moins de 44 kg : en raison des posologies, CAPTIMER 250 mg ne peut souvent pas être utilisé.
- Enfant de 44 à 52 kg (environ 13/14 ans) : **1 comprimé de 250 mg, 2 à 3 fois par jour**
- Adolescent et adulte de plus de 52 kg (à partir de 15 ans) : **1 à 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour.**

Contre-indications (autres que médicamenteuses) :

- **Hypersensibilité aux principes actifs ou aux excipients**
- **Protéinurie / Albuminurie**
- **Néphropathie glomérulaire / Insuffisance rénale chronique / Atteinte rénale**
- **Myasthénie / Polymyosite / Myosite**
- **Erythropénie / Erythroblastopénie**
- **Pemphigus / Lupus érythémateux**
- **Grossesse / Allaitement / Nouveau-né et nourrisson**

Précautions d'emploi

- **Surveillance médicale et biologique régulière**
- En cas de fièvre, vérifier la NFS
- En cas d'essoufflement anormal
- En cas de protéinurie > 1g/24h
- **En cas de galactosémie, en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, de déficit en lactase ou sucrase-isomaltase**

Principaux effets indésirables :

La tiopronine peut provoquer :

- **Nausées, maux d'estomac, diarrhées**
- **Troubles du goût**
- **Fièvre**
- **Réactions cutanées**

Interactions médicamenteuses avec le CAPTIMER :

CAPTIMER peut augmenter l'effet des **antidiabétiques, anti-inflammatoires et mucolytiques.**

Ne pas prendre de médicaments contenant du **fer** en même temps que CAPTIMER.

CAPTIMER peut augmenter les effets indésirables :

- De l'**aciclovir**
- Des **IEC** et des **sartans**, de l'**amphotéricine B**, du **cidofovir**, du **foscarnet** et du **ganciclovir** : risque augmenté de lésions rénales
- Des anticancéreux suivants : **alemtuzumab**, **amsacrine**, **épirubicine**, **témozolomide**, **vindésine** : risque augmenté de modification de la formule sanguine.
- Des **aminosides** et du **cisplatine** : risque augmenté de lésions de l'oreille interne et des reins.

Grossesse, allaitement et Captimer® :

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte. Ne pas allaiter au cours du traitement.


Conseils à donner aux patients :


Les comprimés doivent être avalés entiers, 30 minutes avant un repas, avec un grand verre d'eau.


En règle générale, boire 2 à 3 litre par jour et limiter la consommation de sel. Ne pas boire d'alcool pendant le traitement.

Si une prise a été oubliée, prenez le ou les comprimés oubliés quand vous vous en rendez compte mais ne prenez pas double dose.

Si vous avez pris plus de CAPTIMER que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin.

 Informez votre médecin en cas d'intolérance à certains sucres..

 Il est important de bien réaliser les prises de sang prescrites par votre médecin. Consultez votre médecin en cas de fièvre, en cas d'essoufflement anormal..

 **N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis médical..**

