

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.


N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



### Informez votre médecin :

- si vous avez pris, au cours des deux dernières semaines, un médicament inhibiteur de la monoamine oxydase (ex : Nardil®).
- Si vous devez prendre un traitement antifongique à base de terbinafine ou un antibiotique à base d'érythromycine ou de moxifloxacine.
- si vous avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression artérielle dans l'oeil).

**En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.**



## STRATTERA® Atomoxétine

Gélules de 10 mg, 18 mg, 25 mg,  
40 mg ou 60 mg

### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement du Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité chez les enfants de plus de 6 ans, en cas d'échec avec d'autres thérapeutiques. Il fait parti d'une prise en charge thérapeutique globale incluant des mesures psychologiques, éducatives et sociales.

La prescription de ce médicament est restreinte aux médecins hospitaliers spécialisés en neurologie, pédiatrie ou psychiatrie.

**Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières autorisées à la rétrocession (vente au public).**



## Comment prendre votre médicament?

1 gélule une fois par jour le matin  
(ou parfois 2 fois par jour),  
au cours ou en dehors d'un repas.



Prenez ce médicament tous les jours  
à la même heure.  
Cela vous aidera à ne pas l'oublier.



N'ouvrez pas les gélules : la poudre peut être  
irritante pour les mains et les yeux.  
En cas de contact, rincez abondamment avec de l'eau.

## Que faire en cas d'oubli d'une dose?



Prenez immédiatement  
la dose oubliée puis la dose suivante  
à l'heure habituelle.

**Ne doublez jamais la dose** et ne dépassez pas  
la dose journalière sur une période de 24 heures.



A conserver à température ambiante  
à l'abri de la lumière et de l'humidité



A conserver hors de portée  
des enfants

Ne pas utiliser après la  
date de péremption

## Quelques conseils



**Ce médicament peut être  
exceptionnellement à l'origine d'une  
réaction allergique grave.**

En cas de gonflement du visage et  
de la gorge, de difficulté à respirer  
ou d'urticaire, vous devez arrêter de prendre  
votre traitement  
et contacter immédiatement le médecin.



**N'arrêtez jamais brutalement votre  
traitement.**



**Informez votre médecin , avant de  
prendre Strattera, si vous avez :**





- eu des problèmes de foie
- une tension artérielle élevée ou basse
- des problèmes cardiaques ou antécédent  
d'accident vasculaire cérébral
- des antécédents d'épilepsie.



Si vous envisagez une grossesse,  
parlez-en à votre médecin.  
L'allaitement est déconseillé.

Les effets indésirables (EI) peuvent ne jamais  
apparaître et sont différents d'une personne à une  
autre. Les EI, en grande majorité, ne sont pas graves.  
Certains régressent dès la première semaine de  
traitement.

Il faut les connaître pour pouvoir les identifier et les  
éviter. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin  
qui recherchera une solution pour les atténuer, voire  
les faire disparaître.

Effet indésirable	Que dois je faire?
 Nausées, vomissements, douleurs abdominales, perte d'appétit	Manger par petites quantités et lentement. Évitez les repas trop riches et trop copieux.
 Constipation	Buvez beaucoup d'eau. Mangez de préférence des fibres (légumes verts, fruits..).
 Céphalées, Somnolence, vertiges	Éviter les substances pouvant favoriser les maux de tête (excitant, café, chocolat..). Pour diminuer les vertiges, évitez de vous lever trop brusquement.
 Eruption cutanée	Elle peut être le signe d'une réaction allergique : <b>Informez votre médecin.</b>
Irritabilité, insomnie	Parlez-en à votre médecin.