

Biotine

QIZENDAY®

Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU de cohorte avec PUT

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, prescription hospitalière réservée aux spécialistes en neurologie

Présentation et caractéristiques

Biotine = Vitamine B8, double action sur la SEP :

- Active les acétyl-CoA carboxylases (ACC1 et ACC2) qui synthétisent le malonyl-CoA à la base de la biosynthèse des acides gras et lipides nécessaires à la synthèse myélinique par les oligodendrocytes ;
- Active le cycle de Krebs dans les axones démyélinisés augmentant la synthèse d'ATP et la production d'énergie.

Présentation :

- Gélules de 100 mg (flacons de 90 gélules)

Excipients : Lactose monohydraté, stéarate de magnésium, croscarmellose de sodium, silice colloïdale anhydre, hypromellose, dioxyde de titane E171, bleu brillant FCF E133, oxyde de fer jaune E172, carmin d'indigo E132, solution d'ammoniaque concentrée E527, propylène glycol E1520

Caractéristiques :

- Conservation à T° ambiante

Indications

- Sclérose en plaques (SEP) chez l'adulte, dans les formes progressives primaires ou secondaires (sans poussée depuis au moins 1 an)

Posologie et mode d'administration

► 100 mg 3 fois par jour :
1 gélule matin, midi et soir

- Prise avec ou sans nourriture.
- Ne pas mâcher ni croquer les gélules.
- En cas d'oubli, ne pas doubler la dose à la prise suivante.
- En cas de vomissement dans la demi-heure suivant la prise, une autre gélule peut être prise.

Interactions médicamenteuses

- **Interférence** avec certaines analyses de laboratoire telles que : dosage de la TSH ou des hormones thyroïdiennes, les marqueurs d'anémie, cardiaques, de fertilité, de grossesse, hormonaux, tumoraux, métabolisme osseux et inflammation...

Principaux effets indésirables

- Bronchite
- Infection urinaire
- Evolution des signes et symptômes de la sclérose en plaques


Contre-indications


- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients
- Grossesse, allaitement
- Patients < 18 ans

Précautions d'emploi


- Insuffisance rénale ou hépatique (pas de données)
- Diabète
- Contraception efficace


Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Qizenday® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...), et en particulier lors de prélèvements sanguins pour analyses (nombreuses interférences).

Rappeler au patient de garder sur lui sa carte patient Qizenday® (présente dans chaque boîte de Qizenday®) sur laquelle toutes ces interférences sont mentionnées.

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

