

# Ciclosporine

IKERVIS®

## Conditions de prescription et de délivrance :

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin spécialiste en ophtalmologie**.  
Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières** (dispositif pérenne).

## Présentation et caractéristiques

IKERVIS® est un collyre (couleur blanche) à 1 mg/ml, conditionné en récipients unidoses de 0,3ml, conditionnés par sachet de 5 et en boîte de 30. Conservation à température ambiante.

## Indications et mécanisme d'action

IKERVIS® est indiqué dans le traitement de **la kératite sévère chez les patients adultes présentant une sécheresse oculaire qui ne s'améliore pas malgré l'instillation de substituts lacrymaux**.

La ciclosporine possède des propriétés immunosuppressives et anti-inflammatoires. Elle inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires tout en régulant positivement la libération de cytokines anti-inflammatoires. Elle permet donc de lutter contre la sécheresse oculaire, une maladie immuno-inflammatoire.

## Posologie et mode d'administration

La dose recommandée est d'une goutte dans l'oeil ou les yeux atteints, 1 fois par jour au coucher.

## Contre-indications (autres que médicamenteuses) :

- Hypersensibilité
- Infection oculaire ou péri-oculaire active ou suspectée

## Précautions d'emploi

- **En cas d'antécédents d'herpès oculaire** : utiliser avec précaution
- **En cas de traitement concomitant par bêtabloquant pour un glaucome** : diminution de la sécrétion lacrymale
- **En cas d'utilisation concomitante d'un collyre à base de corticoïdes** : potentialisation des effets de la ciclosporine sur le système immunitaire
- **IKERVIS® contient du chlorure de cétalkonium** pouvant provoquer une irritation oculaire.

## Principaux effets indésirables :

La ciclosporine peut provoquer :

- Douleur oculaire au site d'instillation
- Irritation oculaire
- Larmoiement
- Erythème palpébral
- Hyperémie oculaire
- Vision trouble

## Interactions médicamenteuses avec l'IKERVIS :

Aucune étude d'interaction n'a été réalisée.

## Grossesse, allaitement et IKERVIS® :

L'utilisation d'IKERVIS® est déconseillée pendant la grossesse et pendant l'allaitement.

## Conseils à donner aux patients :



**1 goutte le soir** dans l'œil ou les yeux atteints. Ne pas mettre plusieurs gouttes.  
**En cas d'oubli**, ne rattrapez pas la dose oubliée. Poursuivez normalement le traitement le jour suivant.

### Précautions :

Avant instillation, lavez-vous les mains. Si vous portez des lentilles, enlevez-les.


Agitez doucement le récipient unidose.


L'unidose contient assez de collyre pour traiter éventuellement les 2 yeux. Jetez-la immédiatement après utilisation.

Pratiquez une occlusion nasolacrymale et fermez les paupières pendant 2 minutes.

Si vous utilisez d'autres médicaments à usage ophtalmique local, attendez 15 minutes entre chaque administration. Instillez IKERVIS® en dernier.

 Si vous utilisez déjà d'autres traitements pour les yeux, informez votre médecin.

 En cas d'irritation oculaire persistante, informez votre médecin.

 **N'arrêtez pas le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration** sans avis de votre médecin.

