

## Présentation et caractéristiques :

Actiq® est un antalgique apparenté à la morphine indiqué pour soulager les accès douloureux paroxystiques (ADP).

Dosage	Présentation
Actiq® 200 µg	Comprimé avec applicateur buccal sous plaquette thermoformée Boîte de 3
Actiq® 400 µg	
Actiq® 600 µg	
Actiq® 800 µg	
Actiq® 1200 µg	
Actiq® 1600 µg	

## Indications :

Actiq® est un **antalgique apparenté à la morphine indiqué** pour soulager les **accès douloureux paroxystiques (ADP)** chez les patients recevant déjà un **traitement de fond opioïde** pour des **douleurs chroniques d'origine cancéreuse**.

Un **accès douloureux paroxystique** est une exacerbation passagère d'une douleur chronique par ailleurs contrôlée par un traitement de fond.

## Conditions de prescription et de délivrance :

Le traitement doit être **instauré et suivi par un médecin** ayant l'expérience de la **prise en charge des traitements opioïdes chez les patients atteints de cancer**.

Actiq® est soumis aux règles de **prescription de stupéfiants** :

- Durée de prescription limitée à 28 jours
- Délivrance fractionnée de 7 jours maximum sauf mention expresse du prescripteur « délivrance en une fois »
- Ordonnance sécurisée
- Rédaction en toutes lettres et sans rature.

## Posologie et mode d'administration :

Les douleurs chroniques doivent être contrôlées par un traitement de fond opioïde avant le début de la phase de titration.

**Titration, permet de déterminer la dose efficace d'Actiq®**

- Dose initiale de 200µg avec une augmentation progressive de la posologie si nécessaire
- Soulagement avec **une unité** ?
  - OUI → dose efficace déterminée
  - NON → utiliser le dosage d'Actiq supérieur

**Traitement :**

Les patients doivent utiliser la dose efficace établie.

Si une analgésie satisfaisante n'est pas obtenue dans les 30 min suivant l'administration d'une première unité d'Actiq®, une seconde unité du même dosage pourra être utilisée.

Ne pas prendre plus de 2 unités d'Actiq® pour traiter un même accès paroxystique.

Limiter la consommation à 4 unités d'Actiq® par jour. Si le patient en a besoin de plus, une augmentation de la dose d'Actiq ou du traitement de fond doit être envisagée.

## Principaux effets indésirables :

Effets secondaires	Prévention et CAT
<b>Somnolence, vertiges</b>	Eviter de conduire
<b>Asthénie</b>	Se reposer, faire des exercices légers
<b>Troubles digestifs</b>	Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers
<b>Sécheresse buccale, caries</b>	Bonne hygiène bucco-dentaire.
<b>Difficultés respiratoires</b>	Dyspnée très fréquente
<b>Rétention urinaire</b>	Surveillance en cas de prise de poids rapide
<b>Troubles de la vision</b>	Vision trouble ou double

## Interactions médicamenteuses

### Contre-indication :

- inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)

### Association déconseillée :

- dépresseurs du SNC,
- antagonistes de la morphine (ex: naloxone)
- antalgiques agonistes/antagonistes mixtes (ex :buprénorphine)

L'Actiq® est métabolisé par l'isoenzyme **CYP3A4** , utiliser avec **prudence** avec les inducteurs et inhibiteurs du CYP3A4.

*Liste non exhaustive. Pour avoir la liste complète se référer au Vidal.*

## Contre-indications :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients
- Patients ne recevant pas de traitement de fond morphinique, en raison d'un risque accru de dépression respiratoire.

## Grossesse

Il est préférable de ne pas prendre d'Actiq® au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.



## Conseils à donner au patient

- △ Les patients diabétiques doivent être avertis que ce médicament contient du glucose
- △ Une hygiène buccale normale est recommandée pour réduire tout effet cariogène
- △ Eviter la conduite de véhicule si une somnolence, des étourdissements ou une vision trouble ou double se fait ressentir
- △ Ne pas dépasser 4 unités d'Actiq® par jour. Si nécessité d'une dose supplémentaire contactez votre médecin.

### △ Conseils de prise :

- A prendre en dehors des repas
- Placer le comprimé contre la face interne de la joue
- A l'aide de l'applicateur, laisser fondre le comprimé sans le sucer, le croquer ou le mâcher
- L'Actiq® doit être consommé en 15 minutes
- Les patients souffrant de sécheresse buccale peuvent humidifier leur muqueuse buccale en buvant un peu d'eau avant la prise du médicament.

### △ Gestion du traitement :

- Stockage hors de portée des enfants
- Après la consommation totale d'Actiq®, l'applicateur doit être immédiatement stocké dans un contenant prévu à cet effet qui sera placé hors de portée des enfants
- Si le médicament n'a été que partiellement consommé, le reste du comprimé doit être dissous sous un robinet d'eau chaude.