

Prasugrel

EFIENT®

FICHE CONSEIL Professionnel

Présentation et caractéristiques

EFIENT est un **antiagrégant plaquettaire et un antithrombotique**. Il empêche la formation de caillots. Il agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. L'effet persiste quelques jours après l'arrêt du médicament

Dosage	Présentation
Efient® 10 mg	Comprimé pelliculé. Boîte de 30. Boîte de 90 à l'hôpital

- Ce médicament est **pris en association avec de l'aspirine**, demander au patient si antécédents d'allergie et s'il prend déjà des médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique.

Indications

Efient®, en association avec l'acide acétylsalicylique (AAS), est indiqué dans **la prévention des événements athérotrombotiques chez les patients adultes avec un syndrome coronaire aigu** (c'est-à-dire angor instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST [AI/NSTEMI] ou infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST [STEMI]) traités par une intervention coronaire percutanée (ICP) primaire ou retardée.

Posologie et mode d'administration

Population concernée	Mode d'administration :
Adulte	Dose de charge unique de 60 mg, puis poursuivi par une dose de 10 mg une fois par jour. Chez les patients avec un AI/NSTEMI pour lesquels une coronarographie doit être réalisée dans les 48 heures après l'admission, la dose de charge doit être administrée au moment de l'ICP . Chez les patients avec un syndrome coronaire aigu (SCA) pris en charge par une ICP, l'arrêt prématuré de tout antiagrégant plaquettaire pourrait entraîner un risque accru de thrombose, d'infarctus du myocarde ou de décès dû à la maladie sous-jacente du patient. Les patients sous Efient® doivent également prendre de l'acide acétylsalicylique tous les jours (dose de 75 mg à 325 mg). Un traitement d'une durée allant jusqu'à 12 mois est recommandé , à moins qu'un arrêt d'Efient® soit cliniquement indiqué
Patients ≥75 ans	Utilisation en général déconseillée. Si, après une évaluation attentive du rapport bénéfice/risque individuel par le médecin prescripteur, le traitement est jugé nécessaire, alors une dose d'entretien réduite de 5 mg doit être prescrite après une dose de charge de 60 mg.
Patient de poids < 60 kg :	Dose de charge unique de 60 mg. Puis poursuivi à une dose de 5 mg une fois par jour. La dose d'entretien de 10 mg n'est pas recommandée.
Insuffisance rénale	Aucun ajustement posologique n'est nécessaire (même pour IR terminale)
Insuffisance hépatique	Aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour légère à modérée. Efient® est contre-indiqué chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère

Principaux effets indésirables

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Saignement	Dire au patient d'appeler le médecin en cas de saignements Apparition de saignements même mineurs : - saignement de nez ou gencives - hématomes - hémorragie digestive - saignement au point d'injection en cas de piqûre - saignement oculaire, cérébral, pulmonaire ou articulaire - saignement dans les urines
Anémie	Signes : fatigue, teint pâle, mains et pieds froids...
Hypersensibilité	Signes d'allergie : éruption cutanée, démangeaisons, gonflement des lèvres/de la langue, difficultés à respirer

Interactions médicamenteuses

Efient® interagit avec **les autres anti-coagulants, AINS et antiagrégants plaquettaires.**

Il faut éviter de prendre Efient® avec des médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique ; cela augmenterait le risque de saignement

Liste non exhaustive. Pour voir la liste complète, regarder le Vidal

Grossesse

Il est **déconseillé de prendre Efient®** lors de la grossesse ou de l'allaitement



Conseils à donner aux patients

- ⚠ Surveiller étroitement **le risque de saignement**. Utiliser une brosse à dent souple pour éviter les saignements.
- ⚠ Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit préciser à son médecin, **la liste de ces médicaments avec ou sans ordonnance**
- ⚠ Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien
- ⚠ **Si oubli d'une prise**, prendre Efient® dès qu'on se rend compte de l'oubli. Ne pas doubler la dose pour compenser. Si oubli de plus d'un jour, prendre Efient® normalement le lendemain, sans rattraper la dose oubliée
- ⚠ Prendre la prise quotidienne Efient® pendant ou en dehors des repas. **Ne pas écraser ou couper les comprimés.**
- ⚠ Contacter rapidement le médecin en cas de :
 - Signes hémorragiques
 - Signes d'allergie

Contre-indications

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients
- Saignement pathologique avéré.
- Antécédent d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire (AIT).
- Insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh).