

Ce médicament peut interagir avec de nombreuses autres molécules.

Ne pas oublier de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.

Informez votre médecin si vous devez prendre un traitement à base de clarithromycine, d'érythromycine ou de rifampicine.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Posaconazole


NOXAFIL®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **antifongique**. Il est utilisé en prévention ou pour le traitement d'infections invasives fongiques (liées à des champignons).

NOXAFIL® n'est disponible qu'en pharmacie hospitalière. Il doit être prescrit par un médecin hospitalier.

Dosages	Présentations
Posaconazole 100mg	Comprimés Boîtes de 24 ou 96
Posaconazole 40mg/mL	Suspension buvable Flacon de 105 mL



Posologie Conseils de prise



Plan de prise

Bien respecter la dose prescrite par votre médecin. Prendre votre traitement de préférence à heure fixe afin d'éviter des oublis de prise.

Posologie :

- Comprimés :
 - Le 1^{er} jour : 3 comprimés 2 fois par jour.
 - Les jours suivants : 3 comprimés 1 fois par jour.
 A prendre pendant ou en-dehors des repas.
- Suspension buvable : la dose dépend de la pathologie.
A prendre pendant ou immédiatement après un repas.

Avaler les comprimés entiers, sans les écraser, les mâcher ou les croquer.



Conserver hors de portée des enfants.

La suspension buvable doit être conservée à température ambiante maximum 30 jours après ouverture.

Posaconazole NOXAFIL®

Quelques conseils



Eviter le jus de pamplemousse pendant le traitement.



Ne jamais arrêter votre traitement ni modifier le rythme d'administration sans avis du médecin.



Ne jamais remplacer les comprimés par la suspension buvable et vice-versa.



En cas d'oubli, prendre immédiatement la dose oubliée, puis prendre la dose suivante à l'heure habituelle. Si toutefois le moment de la prochaine prise est proche, sauter la dose oubliée et revenir au rythme de prise habituel. Ne jamais doubler la dose.



Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace au cours du traitement.

La prise de Posaconazole **est contre-indiquée** en cas de grossesse et d'allaitement. En parler à votre médecin.



Ne pas jeter les emballages, les comprimés, ou les flacons dans votre poubelle. Les rapporter à votre pharmacien.

Principaux effets indésirables

	Élévation des tests de la fonction hépatique	Des tests de la fonction hépatique doivent être effectués au début et pendant le traitement.
	Troubles gastro-intestinaux : anorexie, diminution de l'appétit, dysgueusie	Boire entre les repas. Eviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.
	Rougeurs, démangeaisons	En cas d'apparition de symptômes gênants, prévenir votre médecin.
	Fatigue, somnolence, vertiges, maux de tête	Attention à la conduite de véhicules et à l'utilisation de machines. Prendre du repos régulièrement.
	Diminution du nombre de globules blancs, fièvre	En cas de fièvre, prévenir votre médecin.
	Hypertension	En cas d'apparition d'une hypertension, prévenir votre médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**.



Consulter immédiatement votre médecin en cas de :

- Fièvre
- Eruption cutanées et démangeaisons importantes