

## Présentation et caractéristiques :

Le posaconazole est un **antimycosiques à usage systémique**.

Dosage	Présentation
Posaconazole 100mg	Comprimés gastrorésistants. Boîtes de 24 ou 96 comprimés.
Posaconazole 40mg/mL	Suspension buvable 40mg/mL. Flacon de 105 mL.

La suspension buvable peut être conservée maximum 30 jours après ouverture à température ambiante.

## Indications :

- NOXAFIL® est indiqué :
  - dans le **traitement des infections fongiques invasives** (aspergillose, fusariose, ...) chez les patients réfractaires ou intolérants aux traitements de première intention (amphotéricine B, itraconazole, fluconazole)
  - dans la **prophylaxie des infections fongiques invasives** chez les **patients à haut risque** d'en développer (receveurs d'une chimiothérapie d'induction de la rémission pour une leucémie myéloïde aiguë ou un syndrome myélodysplasique, ...).
- NOXAFIL® suspension buvable est également le traitement de 1ère intention de la candidose oropharyngée chez les patients avec une pathologie sévère ou immunodéprimés.

## Conditions de prescription et de délivrance :

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières en rétrocession.

## Posologie et mode d'administration :

Pas d'ajustement posologique en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.

Indications	Posologie	Suspension buvable
Traitement des infections fongiques invasives	Le premier jour 300mg 2 fois par jour. Les jours suivants 300mg par jour.	200mg 4 fois par jour. 400mg 2 fois par jour.
Prophylaxie des infections fongiques invasives	Le premier jour 300mg 2 fois par jour. Les jours suivants 300mg par jour.	200mg 3 fois par jour.
Candidoses oropharyngées	Non concerné.	Le 1er jour : 200mg par jour. Les 13 jours suivants : 100mg par jour.

## Contre-indications :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Administration concomitante avec un substrat du CYP3A4 ou un inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

## Principaux effets indésirables :

Effets secondaires	Prévention et conduite
Elévation des tests de la fonction hépatique	Des tests de la fonction hépatique doivent être effectués au début et pendant le traitement.
Troubles gastro-intestinaux, anorexie, dysgueusie	Boire entre les repas. Eviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.
Asthénie, fatigue, somnolence, vertiges	Attention à la conduite de véhicules et à l'utilisation de machines.
Neutropénie, fièvre	En cas de fièvre prévenir votre médecin.
Hypertension	En cas d'apparition d'une hypertension, prévenir votre médecin.

## Interactions médicamenteuses :

### Contre-indiquées :

- Alcaloïdes de l'ergot de seigle : risque d'ergotisme
- Substrat du CYP3A4 : allongement du QT et torsades de pointes
- Statines : risque de rhabdomyolyse

### Déconseillées :

- Inducteurs enzymatiques
- Vinca-alcaloïdes : risque de neurotoxicité

Liste non exhaustive. Pour avoir la liste complète se référer au Vidal.

## Grossesse

- Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace au cours du traitement.
- Le posaconazole ne doit pas être utilisé pendant la grossesse sauf si le bénéfice attendu pour la mère est supérieur au risque potentiel encouru pour le fœtus.
- L'allaitement doit être interrompu dès le début du traitement par le posaconazole.



## Conseils à donner au patient :

- △ Prendre les comprimés à heure fixe **pendant ou en dehors des repas.**
- △ La suspension buvable doit être prise au cours d'un repas ou immédiatement après un repas.
- △ Avaler les comprimés entiers sans les écraser, les mâcher ou les croquer.
- △ Ne pas prendre les comprimés de posaconazole avec du **jus de pamplemousse.**
- △ **En cas d'oubli**, prendre immédiatement la dose oubliée, puis prendre la dose suivante à l'heure habituelle. Si toutefois le moment de la prochaine prise est proche, sauter la dose oubliée et revenir au rythme de prise habituel. Ne jamais doubler la dose.
- △ Ne jamais arrêter le traitement ou modifier la dose, ou passer des comprimés à la solution buvable sans avis de votre médecin.
- △ Contacter rapidement votre médecin en cas de :
  - Rash, prurit
  - Fièvre
- △ Ne pas jeter les emballages, les comprimés ou les flacons à la poubelle. Les rapporter à votre pharmacien.