

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et de produits naturels à votre médecin.



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.**



## Acétate d'Abiratérone

ZYTIGA®

### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancers de la prostate.


Il est prescrit par un médecin spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

La première prescription doit être effectuée par un médecin hospitalier.

Il est disponible en pharmacie de ville.


Il existe deux dosages:

- ZYTIGA® 250 mg : flacon de 120 comprimés ovales blancs **Nsfp**
- ZYTIGA® 500 mg : flacon de 60 comprimés ovales violets



# Posologie Conseils de prise

## Plan de prise



La dose quotidienne recommandée est de 1g, en **une seule prise**, en association avec 5 ou 10 mg par jour de prednisone ou prednisolone administrée par voie orale.

Les comprimés de ZYTIGA ne doivent pas être pris avec de la nourriture. Il doivent être pris au moins une heure avant ou au moins deux heures après avoir mangé.



Conserver hors de portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Ne pas conserver au réfrigérateur.



Contactez rapidement votre médecin et arrêtez de prendre ce médicament en cas de:

- Faiblesse musculaire, contractions musculaires
- Forts battements du cœur (palpitations)

# Acétate d'Abiratérone ZYTIGA®

## Quelques conseils



Les comprimés sont à avaler entiers (ni brisés, ni mâchés) par voie orale, avec un verre d'eau, en dehors des repas : *prenez votre médicament au moins deux heures après le repas et ne mangez rien pendant au moins une heure.*



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rappelez-les à votre pharmacien.



**N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration** sans avis du prescripteur.








**Si vous avez oublié une prise** de ZYTIGA®, prenez votre dose normale le lendemain, sans la doubler. Si vous oubliez de prendre le ZYTIGA pendant plus d'un jour, prévenez votre médecin sans délai.



Si vous avez des rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être, vous devez utiliser un préservatif ET une autre méthode efficace de contraception. Les femmes enceintes, allaitant ou susceptibles d'être enceintes doivent porter des gants si elles ont à toucher ou manipuler le ZYTIGA®. Ce médicament est contre indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.

# Principaux effets indésirables

	Rétention d'eau et œdèmes	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés. Surveillez votre poids. En cas de prise de poids rapide et inattendue, contactez votre médecin.
	Infection urinaire	Buvez suffisamment. Surveillez votre température. En cas de signes infectieux (fièvre, frissons, douleurs) prévenez votre médecin.
	Augmentation des triglycérides dans le sang	Faites contrôler votre taux de triglycérides dans le sang avant de débuter le traitement. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
	Augmentation des tests de la fonction hépatique	Un contrôle de la fonction hépatique sera réalisé avant de débuter le traitement. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
	Complications cardiaques, augmentation de la pression artérielle	Un traitement préventif pourra être choisi par le médecin en fonction du risque. Consultez le médecin en cas de survenue de symptômes tels qu'essoufflement, douleur thoracique, gonflement des bras ou jambes.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;