

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Bexarotène

TARGRETIN®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des manifestations cutanées de certains lymphomes cutanés .


Il est prescrit par un médecin spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible en pharmacie de ville.

Il est présenté en flacon de 100 capsules (couleur blanc cassé) molles.


Il n' existe qu'un seul dosage:

- TARGRETIN® 75 mg



Posologie Conseils de prise

Plan de prise



Le calcul de la dose initiale est fait d'après la surface corporelle du patient.

La dose initiale recommandée est de 300 mg/m²/jour en une prise par jour lors d'un. Il ne faut pas croquer les capsules.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à température ambiante ne dépassant pas 30°C. Maintenir le flacon bien fermé



Contactez rapidement votre médecin en cas de:

- douleurs abdominales intenses et persistantes
- coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux, urines foncées, confusion et/ou désorientation
- de fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires
- de troubles visuels
- sueurs, palpitations, confusion, troubles du comportement
- de maux de tête inhabituels

Bexarotène TARGRETIN®

Quelques conseils



Le TARGRETIN® se prend à heure fixe, en une prise par jour, pendant le repas.



Evitez de manger des pamplemousses ou de boire du jus de pamplemousse durant votre traitement.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des capsules.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle. En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), lavez ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise, prenez la dose quotidienne avec le repas suivant, le même jour. Prenez ensuite la dose normale, le jour suivant. La dose en un jour ne doit pas être doublée pour compenser.



Ne pas prendre en cas de grossesse et d'allaitement. Utiliser simultanément deux méthodes fiables de contraception (dont une différente des contraceptifs oraux, utilisation de préservatifs par les hommes) pendant le traitement et jusqu'à un mois après l'arrêt de celui-ci. Pour les femmes en âge de procréer, un dosage des β -HCG plasmatiques doit être effectué la semaine qui précède le début du traitement.



Principaux effets indésirables

| | | |
|---|--|---|
|  | Augmentation du taux de lipides | Faites pratiquer les bilans prescrits. Surveillez votre poids. Privilégiez une alimentation saine et une activité physique régulière. Evitez les aliments riches en graisses et toute prise d'alcool. |
|  | Baisse des globules blancs et anémie | Limitez les contacts avec les personnes malades et désinfectez soigneusement toute plaie. Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. |
|  | Maux de tête, fatigue | Reposez-vous souvent et faites des exercices légers (marche). Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin. |
|  | Bouffées de chaleur, démangeaisons, rougeurs | Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil et toute exposition à la chaleur. |
|  | Vomissements | Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers. |
|  | Diarrhées | Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Buvez au moins 2 litres par jour. |
|  | Troubles visuels | Portez des verres teintés. Evitez de conduire la nuit. |
|  | Diminution du taux de sucre | Surveillez régulièrement votre glycémie si vous êtes diabétique. Apprenez à reconnaître les signes : sueurs, palpitations, confusion, troubles visuels et du comportement |

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin. Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien