

Chlorambucil

CHLORAMINOPHENE®

FICHE
CONSEIL
Professionnel

Présentation et caractéristiques

CHLORAMINOPHENE® est un agent alkylant bifonctionnel du groupe des moutardes à l'azote, déprimant surtout la lignée lymphoïde.

Présentation : gélules de 2 mg (blanches opaque). Présenté par boîte de 30, sous plaquettes thermoformées.

Caractéristiques :

- A conserver à une température ne dépassant pas 25°C pendant 18 mois
- Médicament qui peut être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en néphrologie ou en hématologie. Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.
- Médicament remboursé à 100% par la sécurité sociale.

Indications

- Leucémie lymphoïde chronique.
- Lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens.
- Neuropathies membraneuses avec syndrome néphrotique idiopathique (protéinurie sup ou égale à 3.5g/j ou ratio protéine/créatinine > 2) en association avec les corticostéroïdes.

Posologie et mode d'administration

<p><u>Pour les désordres de la lignée lymphoïde :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- traitement continu : 1 à 6 gélules/jour tous les jours- ou 6 à 10 mg/m²/j pendant 5 jours tous les 30 jours <p>La posologie est basée sur le poids corporel des patients</p> <p><u>En thérapie immunosuppressive :</u></p> <p>0,2 mg/kg/j pendant 4 à 8 semaines</p>	<p>En une prise quotidienne, le matin, à jeun</p>
--	---

Chez le malade insuffisant rénal, une réduction de dose à :

- 1,5 à 9mg/j pour les patients avec un DFG compris entre 15 et 60ml/min/1.73m² ou
- 1 à 6mg/j pour les patients ayant un DFG<15ml/min/1.73m² ou hémodialysés peut être envisagé en traitement continu

Précaution d'emploi chez les patients présentant une insuffisance hépatique (métabolisation par le foie)

Si le traitement par Chloraminophène se substitue à un traitement par corticoïdes, le délai d'action de ce produit oblige à maintenir le traitement corticoïde pendant un trimestre environ en réduisant les doses progressivement.

Principaux effets indésirables et suivi de traitement

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Leucopénie	Surveillance des signes d'infection. Surveillance hématologique fréquente et régulière. Dose dépendante et cumulative. Réversible. Arrêt du traitement à voir avec l'oncologue si le taux des granulocytes (polynucléaires) est inférieur à 2G/L.
Thrombopénie	Surveillance des signes d'hémorragies. Surveillance hématologique fréquente et régulière. Dose dépendante et cumulative. Réversible. Voir avec l'oncologue pour une adaptation posologique.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers. Traitement anti-émétique éventuel.
Eruption cutanée	Utiliser un savon doux et un agent hydratant. Eviter les expositions au soleil. Une crème hydratante permet de soulager les symptômes
Fibrose pulmonaire	En cas de traitement chronique, surveillance pulmonaire clinique et radiologique.
Troubles hépatiques	Surveillance hépatique
Autres	Oligospermie, azoospermie en général définitive chez l'homme. Aménorrhée et ménopause précoce chez la femme. Hyperuricémie. Troubles neurologiques rares

Interactions médicamenteuses

Interaction à prendre en compte entre le CHLORAMINOPHENE® et :

- la **ciclosporine** ou le **tacrolimus** : immunodépression excessive et risque de pseudolymphomes.
- les **vaccins vivants atténués** : risque de maladie généralisée éventuellement mortelle. Utiliser un vaccin inactivé quand il existe (ex : poliomyélite).


Grossesse, allaitement


CHLORAMINOPHENE® est contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante. Utiliser une contraception efficace.


Conseils à donner aux patients


 Les gélules se prennent en **une prise** avec un grand verre d'eau, **à jeun**.


 Ne pas ouvrir les gélules.


 Se laver soigneusement les mains avant et après la manipulation des gélules.

 Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement du rein.

 Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise.

 En cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissements...), les laver immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).

 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.

 **Si une prise a été oubliée, la dose manquée ne doit pas être rattrapée. Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.**

 **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**

 **Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de :**

- fièvre/ signe infectieux pour réaliser une NFS en urgence
- signes hémorragiques
- difficultés à respirer ou toux anormale (radio du thorax : fibrose pulmonaire possible)

Pour une information complète, se reporter au RCP.