

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Crizotinib

XALKORI®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancer du poumon.


Il est prescrit par un médecin spécialiste en oncologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible en pharmacie de ville.

Il est présenté par boîtes de 60 gélules, sous plaquettes thermoformées.

Il existe 2 dosages:

- XALKORI® 200 mg
- XALKORI® 250 mg



Posologie Conseils de prise

Crizotinib
XALKORI®

Principaux effets indésirables

Plan de prise

La dose est strictement personnelle, elle vous sera expliquée par le médecin.

La posologie usuelle est de 250 mg, 2 fois par jour (soit 500 mg/jour), en continu, au cours ou en dehors du repas.

Les gélules ne doivent pas être écrasées, ni dissoutes ou ouvertes.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à température ambiante



Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Signes infectieux
- Signes hémorragiques (saignements de nez, crachats comportant du sang)
- Essoufflement, de manque d'oxygène, de toux, de difficulté à respirer
- Coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux, urines foncées, confusion et/ou désorientation.

Quelques conseils



Les gélules doivent être avalées entières, de préférence avec de l'eau, au cours ou en dehors du repas. Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Prudence chez les utilisateurs et conducteurs de machines. Ce traitement peut entraîner des troubles de la vision, des étourdissements et de la fatigue.



Évitez de consommer du pamplemousse ou du jus de pamplemousse pendant le traitement.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.

En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise :

- si la dose suivante est prévue dans plus de 6 heures : prenez immédiatement la dose oubliée
- si la dose suivante est prévue dans moins de 6 heures : ne pas prendre la dose oubliée. Prenez la dose à l'heure habituelle et notez cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. Il est recommandé aux femmes et aux hommes d'avoir recours à une méthode de contraception efficace pendant le traitement et 90 jours au minimum après la fin de celui-ci

	Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires.
	Troubles cardiaques	Contactez votre médecin en cas d'étourdissement, d'évanouissement, d'hypotension ou de douleur à la poitrine.
	Troubles visuels	Une vision double, floue, détériorée ou apparition de corps flottants. Informez votre médecin si les troubles de la vision persistent ou s'aggravent.
	Complications respiratoires	Des symptômes respiratoires non spécifiques tels qu'une toux ou une difficulté à respirer peuvent survenir. Informez votre médecin dès leur survenue. Une adaptation de la dose ou un arrêt du traitement sont à envisager.
	Diarrhées	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Buvez au moins 2 litres par jour et privilégiez les féculents, les carottes et les bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin.
	Nausées, vomissements	Buvez entre les repas. Évitez les aliments froids, gras ou épicés. Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers. En cas de vomissements, rincez vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin.
	Constipation	Buvez au moins 2L d'eau par jour, ayez une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière. Alimentation riche en fibres, pratiquez une activité physique. Si constipation prolongée, contactez votre médecin.
	Autres	Perte d'appétit, modification du goût, éruption cutanée, gonflement des mains et/ou des pieds, picotement dans un membre.