

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Hydroxycarbamide

HYDREA®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des :

- leucémies myéloïdes chroniques
- polyglobulie primitive
- thrombocytémie essentielle

Il est prescrit par un médecin hospitalier ou de ville.


Il est disponible en pharmacie de ville.

Il s'agit de gélules roses et vertes.

Il est présenté par boîtes de 20 gélules, sous plaquettes thermoformées.

Il n'existe qu'un seul dosage :

- HYDREA® 500 mg



Posologie Conseils de prise

Plan de prise

La posologie est strictement personnelle, elle vous sera expliquée par votre médecin. Les gélules sont à prendre en **1 prise par jour**.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à température inférieure à 25°C

Contactez rapidement votre médecin en cas de:

- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons...)
- Apparition de selles noires, de saignements de nez, et de crachats comportant du sang
- Forte douleur, notamment au niveau des articulations.
- Difficultés à respirer ou toux anormale

Hydroxycarbamide HYDREA®

Quelques conseils



Les gélules sont à prendre avec un grand verre d'eau, en dehors ou au cours des repas, en 1 prise par jour.

Si vous n'arrivez pas à avaler les gélules, le contenu des gélules peut être dispersé dans un verre d'eau: manipulation à réaliser avec des gants et un masque.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



A l'initiation du traitement et pendant le traitement, boire beaucoup d'eau pour maintenir le bon fonctionnement du rein, notamment des boissons alcalines.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise, ne pas prendre celle manquée, Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et notez cet oubli sur le carnet de suivi



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise.



Ne pas prendre en cas de grossesse ou d'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace.

Principaux effets indésirables

	Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux: fièvre > 38°C, frissons, sueurs, toux, brûlures urinaires. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits.
	Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ... En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur.
	Nausées Vomissements	<u>A éviter</u> : aliments frits, gras ou épicés En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 h avant de manger. <u>Conseil</u> : Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers et buvez entre les repas
	Diarrhées	<u>A éviter</u> : café, boissons glacées, lait, fruits, légumes crus, céréales, pain complet, alcool. <u>A privilégier</u> : féculents, carottes, bananes Buvez au moins 2 L d'eau par jour
	Plaies douloureuses dans la bouche	<u>A éviter</u> : aliments acides, épicés et irritants. Une bonne hygiène buccale est conseillée..
	Eruption cutanée	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil.
	Autres	Perte de cheveux, céphalées, confusions, vertiges, anorexie.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;