

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Altrétamine HEXASTAT®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancers de l'ovaire et de cancers du poumon.

Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétant en cancérologie.


Il nécessite une prescription hospitalière,

Il est disponible uniquement en pharmacie hospitalière, en rétrocessions.

Il est présenté par boîtes de 25 gélules violettes, en blister de 5 gélules.


Il n'existe qu'un seul dosage :

- HEXASTAT® 100 mg



Posologie Conseils de prise

Plan de prise



La posologie est strictement personnelle. L'administration se fait en plusieurs prises par jour **après le repas et avant le coucher**.

Il peut être utilisé **seul ou en association** avec un autre médicament, chaque cycle de traitement dure **28 jours**.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de l'humidité, à une température ne dépassant pas 30°C



Contactez rapidement votre médecin en cas de:

- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons...)
- Apparition de selles noires, de saignements de nez, de crachats comportant du sang
- Démangeaisons, rougeurs, plaques sur la peau.

Altrétamine HEXASTAT®

Quelques conseils



Les gélules sont à prendre par voie orale avec un grand verre d'eau, après le repas. Les gélules ne doivent pas être ouvertes ou mâchées.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules. Utilisez des gants quand vous manipulez les gélules.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise, ne prenez pas celle manquée, Prenez la dose suivante habituellement prescrite et notez cet oubli sur le carnet de suivi



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), lavez ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).








Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Ne pas prendre en cas de grossesse ou d'allaitement. Pour les femmes en âge de procréer et pour les hommes traités par HEXASTAT®, une méthode de contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.

Principaux effets indésirables

	Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Prenez votre température avec chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons, sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
	Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ... En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur.
	Nausées Vomissements	<u>A éviter</u> : aliments frits, gras ou épicés En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 h avant de manger . <u>Conseil</u> : Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers et buvez entre les repas
	Diarrhées	<u>A éviter</u> : café, boissons glacées, lait, fruits, légumes crus, céréales, pain complet, alcool. <u>A privilégier</u> : féculents, carottes, bananes Buvez au moins 2 L par jour
	Fatigue musculaire, confusion, troubles du sommeil, hallucinations	Reposez-vous souvent. Des exercices légers, peuvent être utiles (marche). Prudence en cas d'utilisation de véhicules ou de machines.
	Autres	Perte de cheveux réversible, réactions cutanées, absence de règles chez la femme peut survenir.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;