

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Nilotinib

TASIGNA®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de leucémies.


Il est prescrit par un médecin spécialiste en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible en pharmacie de ville.

Il est présenté par boîtes de 28 (conditionnement hebdomadaire) ou 112 (conditionnement mensuel) gélules jaune pâle, sous plaquettes thermoformées.

Il existe 3 dosages:

- TASIGNA® 50 mg
- TASIGNA® 150 mg
- TASIGNA® 200 mg



Posologie Conseils de prise

Nilotinib
TASIGNA®

Principaux effets indésirables

Plan de prise

Chez l'adulte, l'administration se fait en **deux prises de 300 mg** ou de **400 mg** par jour (selon l'indication), toutes les 12 heures et à distance des repas.

Chez l'enfant, la dose dépend du poids, elle vous sera donnée par le médecin.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30C dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité.

Contactez rapidement votre médecin en cas de:

- Signe infectieux (fièvre, toux...)
- Saignement anormal, selles noires
- Prise de poids rapide et inattendue
- Douleur dans la poitrine et abdominale importante
- Œdème, rougeur, gonflement au niveau des membres inférieurs.

Quelques conseils



La dose doit être administrée par voie orale avec un grand verre d'eau au moins en respectant un intervalle de **12 heures entre chaque prise.**



Aucun aliment ne doit être consommé dans les deux heures précédant une prise, ni dans l'heure qui suit.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Eviter de manger des pamplemousses ou de boire du jus de pamplemousse pendant toute la durée du traitement.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rappelez-les à votre pharmacien.



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite à l'heure habituelle et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne pas prendre en cas de grossesse ou d'allaitement.

	Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires. Si saignement important, contactez le médecin.
	Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux.
	Nausées et vomissements	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers. En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. Si symptômes persistants, prévenez le médecin.
	Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, contactez votre médecin.
	Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Buvez au moins 2 litres par jour et privilégiez les féculents, les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin.
	Éruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil. Protection solaire écran total. Informez votre médecin pour des traitements.
	Œdèmes, rétention d'eau	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements trop serrés. Surveillez le poids. Si prise de poids rapide, voir le médecin.
	Maux de tête, douleur articulaire et musculaire	Reposez-vous souvent, mais faites des exercices légers (marche). Evitez les mouvements trop répétitifs. En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.