

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.**



## Osimertinib

TAGRISSO®

### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancer du poumon.


Il est prescrit par un médecin spécialiste en oncologie ou par un médecin compétent en cancérologie.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières.

Il est présenté par boîtes de 30 comprimés pelliculés

Il existe 2 dosages:

- TAGRISSO® 40 mg
- TAGRISSO® 80 mg



# Posologie Conseils de prise

## Osimertinib TAGRISSO®

## Principaux effets indésirables

### Plan de prise

La posologie usuelle d'Osimertinib est de **80 mg en une prise orale journalière** unique, pendant ou en dehors des repas, **toujours à la même heure**, avec un grand verre d'eau.



### Quelques conseils



Les comprimés de Tagrisso® doivent être avalés entiers (ni écrasés, ni mâchés), avec un verre d'eau, et peuvent être pris avec ou sans nourriture, à heure fixe.



Si vous avez des difficultés à avaler, vous pouvez mélanger le comprimé dans 50 ml d'eau plate (sans l'écraser). Remuez jusqu'à ce que le comprimé se soit dispersé en très petites particules. Buvez le liquide immédiatement. Puis rincez le verre complètement avec de nouveau 50 ml d'eau plate et buvez-le.



Ne pas consommer de Millepertuis pendant le traitement (gélules, tisanes...)



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Si vous avez oublié de prendre votre comprimé de Tagrisso®, 2 cas se présentent :

- En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 heures, prenez la dose.
- En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 heures, ne prenez pas la dose oubliée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



**N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**



Il est déconseillé de prendre Tagrisso® pendant la grossesse ou l'allaitement. Une méthode efficace de contraception doit être instaurée pendant le traitement et être poursuivie pendant au moins 2 mois après l'arrêt du traitement pour les femmes et 4 mois pour les hommes.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Modification du bilan sanguin                          | Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin. En cas de doute, prenez votre température. En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenez votre médecin.  |
|  | Rash, prurit, dermatite, eczéma, sécheresse de la peau | Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil et utilisez une protection solaire (chapeau, écran total). En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez votre médecin.  |
|  | Diarrhée   | Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les céréales, le pain complet, les fruits et légumes crus et l'alcool. Buvez au moins 2 litres par jour et privilégiez les féculents, les carottes cuites, et les bananes. Si les symptômes persistent, prévenez votre médecin.  |
|  | Inflammation et rougeur du pourtour des ongles         | Avoir une bonne hygiène des mains. Evitez de vous ronger les ongles et limitez les produits de manucures. Utilisez des agents hydratants. En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes, prévenez votre médecin.   |
|  | Inflammation de la bouche                              | Evitez les aliments épicés, chauds et acides. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. Humidifiez avec un vaporisateur. En cas de fièvre associée, en cas de difficulté à s'alimenter, en cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : prévenez votre médecin. |
|  | Fièvre, toux, difficultés à respirer                   | Limitez si possible les contacts avec des personnes ayant une infection contagieuse. Prévenez <b>immédiatement</b> votre médecin si ces signes apparaissent.  |
|  | Symptômes cardiaques                                   | Prévenez immédiatement votre médecin si des signes cardiaques apparaissent.   |

**Arrêtez de prendre Tagrisso® et consultez immédiatement votre médecin en cas de :**

- Difficulté à respirer, toux, fièvre,
- Palpitation

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;