

Topotécan

HYCANTIN®

FICHE CONSEIL Professionnel

Présentation et caractéristiques

HYCANTIN® est un agent antinéoplasique, inhibiteur de la topoisomérase I, enzyme qui joue un rôle essentiel dans la réplication de l'ADN. L'inhibition de la topoisomérase I par le topotécan se traduit au niveau cellulaire par l'induction de lésions simple-brin de l'ADN.

Présentation : comprimé de 0,25 mg et 1 mg. Présenté par boîtes de 10.

Caractéristiques :

- A conserver au **réfrigérateur** (entre 2 et 8°C). conserver les plaquettes thermoformées dans leur emballage extérieur afin de les protéger de la lumière. Ne pas congeler.
- Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie ou aux médecins compétents en cancérologie.
- Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

Indications

- Traitement **cancer du poumon à petites cellules** en rechute (lorsque la réintroduction de la première ligne de traitement n'est pas appropriée) **chez l'adulte**.

Posologie et mode d'administration

Posologie recommandée:
Par voie orale

2,3 mg/m²/jour

En cure de 5 jours consécutifs avec un intervalle de 3 semaines entre le début de chaque cure (J1=J21)

L'administration d'une cure sera reportée si les chiffres du bilan sanguin demeurent inférieurs aux seuils prévus.

Une adaptation des doses est nécessaire en cas d'insuffisance rénale.

Grossesse, allaitement

Ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Principaux effets indésirables et suivi de traitement

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Neutropénie	Surveillance hebdomadaire de l'hémogramme. Limiter les contacts avec les personnes malades. Fréquemment sévère avec parfois fièvre ou infection. En cas de neutropénie sévère, un recours aux facteurs de croissance hématopoïétiques ou une réduction des doses est à voir avec l'oncologue.
Thrombopénie et risque hémorragique	Surveillance hebdomadaire des plaquettes. Utiliser une brosse à dent souple. Éviter les AINS. En cas de thrombopénie sévère, une diminution des doses voir un recours à une transfusion de plaquettes peut être nécessaire. Voir avec l'oncologue.
Anémie	Surveillance hebdomadaire de l'hémogramme. Modérée à sévère, peut nécessiter une transfusion de globules rouges. Réduction de posologie à voir avec l'oncologue.
Nausées et vomissements	Association d'antiémétiques classiques à titre préventif. Boire entre les repas. Éviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers. Peuvent être sévères. L'administration intraveineuse est à envisager avec l'oncologue en cas de vomissements incontrôlés. Un traitement antiémétique classique est recommandé.
Diarrhée	Une prise en charge précoce de tous les premiers signes et symptômes est importante. Éviter le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Parfois sévères, notamment chez les plus de 65 ans. Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégier les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. Traitement symptomatique par anti-diarrhéiques en complément d'une réhydratation orale. L'administration intraveineuse est à envisager avec l'oncologue en cas de diarrhées incontrôlées.
Constipation	Privilégier une bonne hydratation et une activité physique régulière. Boire au moins 2 litres d'eau par jour.
Mucites, stomatites	Éviter les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale. (bain de bouche éventuels).
Fatigue importante	Repos fréquent, bonne hygiène de vie, exercices légers (marche). Prudence en cas de conduite de véhicule.

Alopécie	Utiliser une brosse molle et éviter les décolorations, permanentes et colorations. Les cheveux repoussent à l'arrêt de la chimiothérapie.
Autres	Anorexie Risque de pathologie pulmonaire interstitielle. Hyperbilirubinémie


Interactions médicamenteuses


Le topotécan est un substrat de l'ABCB1 (glycoprotéine P) et de l'ABCG2 (BCRP).

Contre-indication avec les vaccins vivants atténués.


Vaccins inactivés, il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie (risque de diminution de l'efficacité du vaccin).

Conseils à donner aux patients


 Les gélules d'HYCANTIN® **doivent être avalées entières, en une prise par jour**. Elles ne doivent pas être mâchées, écrasées ou coupées. Elles peuvent être prises **pendant ou en dehors des repas**.


 Se laver soigneusement les mains avant et après la manipulation des gélules.

 Ne pas laisser à la portée des enfants.

 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.

 Conseiller aux hommes d'uriner en position assise.

 En cas de contamination des vêtements ou des draps (vomissements...), les laver immédiatement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).

 **Si une prise a été oubliée, la dose manquée ne doit pas être rattrapée. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.**

 **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**

 **Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de :**

- toux, fièvre, dyspnée et/ou hypoxie
- diarrhée ou vomissements sévère
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang
- signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence.

Pour une information complète, se reporter au RCP.