

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Torémifène

FARESTON®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de certaines formes de cancer du sein.

Il est prescrit par un médecin hospitalier ou de ville


Il est disponible en pharmacie de ville.

Il s'agit de comprimés blancs.

Il est présenté par boîtes de 30 comprimés, sous plaquettes thermoformées.

Il n'existe qu'un seul dosage :

- FARESTON® 60 mg



Posologie Conseils de prise

Plan de prise

La dose recommandée est de 60 mg par jour, soit 1 comprimé par jour.



Conservez hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit frais et sec

Contactez rapidement votre médecin en cas de:

- Prise de poids rapide et inattendue
- Gonflement et/ou douleur au niveau d'un membre, difficulté à respirer
- Saignement vaginal

Torémifène FARESTON®

Quelques conseils



Le FARESTON peut être pris au cours ou en dehors d'un repas, avec un grand verre d'eau.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du comprimé.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Signalez à votre médecin tout antécédent de trouble du rythme cardiaque et/ou de maladie thromboembolique.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise, ne prenez pas celle manquée, Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et notez cet oubli sur le carnet de suivi.



Ne pas prendre en cas de grossesse ou d'allaitement. Ce médicament est réservé à la femme ménopausée

Principaux effets indésirables

	Bouffées de chaleur, transpiration	<p><u>A éviter</u> : les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress, la chaleur.</p> <p><u>Conseil</u> : Faites régulièrement de l'exercice, Restez au frais, Portez des vêtements légers, Buvez beaucoup d'eau.</p>
	Étourdissements, fatigue, vertiges	Reposez-vous souvent. Prudence pour les utilisateurs de véhicules et de machines.
	Nausées et vomissements	<p><u>A éviter</u> : aliments frits, gras ou épicés</p> <p>En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 h avant de manger</p> <p><u>Conseil</u> : Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers et buvez entre les repas</p>
	Oedèmes des membres	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Évitez les vêtements serrés. Surveillez votre poids et contactez votre médecin en cas de prise de poids rapide et inattendue.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;