


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Si vous souffrez de brûlures d'estomac, prenez vos médicaments antiacides 2h avant ou 1h après la prise d'ADEMPAS.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture:

.....
.....
.....

Tél :

.....

Riociguat

ADEMPAS®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique**.

Il est prescrit par un **médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou médecine interne**.

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières**.

ADEMPAS se présente sous la forme de boîtes de 42 ou 90 comprimés.

Il existe 5 dosages différents :

- **0,5 mg** (comprimés blancs)
- **1 mg** (comprimés jaunes pâles)
- **1,5 mg** (comprimés jaunes orangés)
- **2 mg** (comprimés oranges pâles)
- **2,5 mg** (comprimés rouge orangés)

Posologie Conseils de prise

Riociguat
ADEMPAS®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Posologie:

Dose initiale de 1 comprimé de 1 mg 3 fois par jour pendant 2 semaines puis augmentation progressive de la posologie jusqu'à atteindre une dose d'entretien maximale de 1 comprimé de 2,5 mg 3 fois par jour

.....

.....

.....

En cas d'oubli:

Ne prenez pas le comprimé oublié.
La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.

Ne doublez jamais la dose.



Pas de conditions particulières de conservation



Conservez hors de portée des enfants.

Quelques conseils



Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés à de l'eau ou à des aliments semi-liquides.



Les prises doivent être espacées de 6 à 8h.



Prendre ce médicament aux mêmes heures chaque jour vous aidera à ne pas oublier votre traitement.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin.



Si vous avez pris plus d'ADEMPAS® que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des effets indésirables. Informez immédiatement votre médecin



Informez votre médecin **en cas d'intolérance au galactose et/ou au lactose.**



Il est fortement conseillé d'arrêter de fumer (risque de réponse plus faible au traitement). Si vous arrêtez ou commencez à fumer pendant le traitement, informez votre médecin.



Utiliser une **méthode de contraception efficace pendant le traitement.** L'allaitement est déconseillé.

	Maux de tête	PARACETAMOL efficace dans la plupart des cas <u>A noter:</u> évitez les comprimés effervescents si vous êtes soumis à un régime pauvre en sel (teneur élevée en sel) Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin.
	Vertiges	Pour diminuer les vertiges, évitez de vous lever trop brusquement.
	Gonflement de vos jambes et de vos chevilles	Informez votre médecin.
	Diarrhées	Ne mangez pas de légumes, ni de fruits ni de laitage. Préférez les féculents: riz, carottes cuites, pain blanc. Buvez abondamment de petites quantités d'eau.
	Nausées Inconfort digestif	Mangez par petites quantités. Évitez les repas trop gras et trop copieux.
	Anémie	Il est important de réaliser les prises de sang prescrites par votre médecin et de lui rapporter les résultats à chaque RDV.
	Congestion nasale	Lavage du nez au sérum physiologique

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;