

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Informez votre médecin en cas de traitement anti-infectieux en cours**

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....  
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....  
.....  
.....

Tél :

.....  
.....

## Sildénafil REVATIO®

### À quoi sert ce médicament ?

Ce traitement est un médicament de **l'hypertension artérielle pulmonaire**.  
**Il améliore la circulation sanguine pulmonaire.**

Il est prescrit par un **médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou médecine interne.**

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies Hospitalières.**

Ce médicament se présente sous la forme:



- De 6 plaquettes de 15 **comprimés** blancs dosés à **20 mg.**

**A conserver à température ambiante.**

- Ou d'une **suspension buvable dosée à 10 mg/ml.**  
**La suspension sera préparée par votre pharmacien.**

Conservez la suspension buvable à température ambiante ou au réfrigérateur. Elle est **stable 30 jours après reconstitution.**

Conservez hors de portée des enfants

# Posologie Conseils de prise

## Plan de prise



La posologie est de 1 comprimé 3 fois par jour. Le comprimé peut être pris **avant, pendant ou après le repas.**



La posologie pourra parfois être réduite à 1 comprimé 2 fois par jour ou 1 comprimé 1 fois par jour.

.....

.....

.....

### Chez les enfants :

<= 20kg : 10mg, soit **1ml de suspension buvable, 3 fois par jour**

>20kg : 20mg, soit **2ml de suspension buvable, 3 fois par jour**

 En cas d'oubli: prenez le comprimé oublié dès que possible. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle. Ne doublez jamais la dose.

Si vous avez pris plus de REVATIO® que vous n'auriez dû, vous risquez de voir apparaître des effets indésirables. Informez immédiatement votre médecin.



N'arrêtez jamais le traitement ou de modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin.

# Sildénafil REVATIO®

## Quelques conseils



Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau



Bien agiter le flacon de suspension buvable pendant 10 secondes avant de prélever. Toujours prélever la suspension avec la seringue fournie, en retournant complètement le flacon. Votre enfant doit être en position assise au moment de l'administration. Mettre l'extrémité de la seringue contre la joue et pousser le piston lentement. Bien rincer la seringue après chaque utilisation.



Les **prises** doivent être **espacées** de **6 à 8h.**



**Ne pas boire de jus de pamplemousse** pendant le traitement



Utiliser une méthode de **contraception efficace pendant le traitement.**  
**L'allaitement est déconseillé.**



Informez votre médecin en cas **d'intolérance au galactose et/ou au fructose.**

# Principaux effets indésirables

 	<p>Maux de tête Douleurs musculaires et du dos</p>	<p><b>PARACETAMOL efficace dans la plupart des cas</b> <u>A noter:</u> évitez les comprimés effervescents si vous êtes soumis à un régime pauvre en sel (teneur élevée en sel) Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin</p>
 	<p>Vertiges, étourdissements</p>	<p>Evitez de vous lever trop brusquement.</p>
	<p>Rougeur de la face</p>	<p>Cet effet est normal. Vous pouvez l'atténuer en utilisant une base de maquillage verte.</p>
	<p>Diarrhées, reflux, nausées Inconfort digestif</p>	<p>Mangez lentement. Evitez les repas trop riches et trop copieux.</p>
	<p>Anomalies visuelles soudaines</p>	<p>Informez immédiatement votre médecin</p>
	<p>Rhinite</p>	<p>Lavage du nez au sérum physiologique</p>

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;