

Levamisole

ELMISOL®

Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction de prescripteurs

Présentation et caractéristiques

Immunosuppresseur

Présentations :

- Comprimés de 5mg (boîte de 50 cpr)
- Comprimés de 10mg (boîte de 50 cpr)
- Comprimés de 25mg (boîte de 50 cpr)
- Comprimés de 50mg (boîte de 50 cpr)

Excipients : Lactose monohydraté, glycolate de sodium, amidon de maïs, hydroxypropylcellulose, cellulose microcristalline, hydroxypropylméthylcellulose, stéaryl fumarate de sodium, talc, PEG, saccharine sodique, dioxyde de titane

Caractéristiques :

- Conservation à T° ambiante < 25°C

Indications

- Syndrome néphrotique cortico-sensible idiopathique de l'enfant, lorsque le niveau de corticodépendance dépasse 15mg/m² un jour sur deux ou après la 3ème poussée

Posologie et mode d'administration

- ▶ 2,5 mg/kg, en une prise, un jour sur deux
- ▶ Dose max : 150mg un jour sur deux

- ▶ Prise pendant les repas.
- ▶ Surveillance : NFS mensuelle.
- ▶ Au bout de 2 mois, diminuer progressivement la corticothérapie.
- ▶ Arrêt du traitement au bout de 6 mois si inefficacité.
- ▶ En cas d'oubli : prise de la dose si oubli < 24h, saut de la prise si > 24h.

Interactions médicamenteuses

- Phénytoïne (élévation des concentrations de Phénytoïne)
- Anticoagulants
- Autres médicaments avec effets secondaires hématologiques

Principaux effets indésirables

- Neutropénie, thrombocytopénie, agranulocytose
- HTAP
- Vascularite
- Anxiété, insomnie, dépression
- Leuco-encéphalopathie (confusion, perte de mémoire, somnolence...)
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, baisse d'appétit
- Douleurs musculaires
- Réactions d'hypersensibilité, éruption cutanée, démangeaisons
- Inflammation de la bouche, modification de l'odorat
- Pancréatite

Contre-indications

- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients
- Alcool
- Grossesse, allaitement

Précautions d'emploi

- Insuffisance hépatique ou rénale (adaptations de posologie)

Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Elmisol® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

