

# Idébénone

MNESIS®

## Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction de prescripteurs

## Présentation et caractéristiques

Analogue coenzyme Q10, psychostimulant, anti-oxydant

### Présentation :

- Comprimés enrobés de 45 mg (boîte de 30 comprimés)

*Excipients : Lactose monohydraté, saccharose, carmellose, calcique, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, dioxyde de titane, talc, gomme arabique, carbonate de magnésium, acétate phtalate de polyvinyle*

### Caractéristiques :

- Conservation à T° ambiante < 30°C

## Indications

- Démences vasculaires ou liées à la maladie d'Alzheimer
- Encéphalomyopathie mitochondriale
- Ataxie de Friedreich (prévention de l'hypertrophie cardiaque)

## Posologie et mode d'administration

<u>Chez les adultes et les enfants &gt; 4 ans</u>	<b>► 5 mg/kg/j répartis en 3 prises</b> (dose pouvant être augmentée jusqu'à 15 mg/kg/j)
---	---

- Durée du traitement à adapter selon le rapport bénéfice / risque du patient.
- Comprimés à prendre au cours des repas.
- En cas d'oubli prendre la dose suivante à l'heure habituelle, ne pas prendre de double dose.

## Interactions médicamenteuses

- Amitriptyline

## Principaux effets indésirables

- Vertiges, agitation, troubles du sommeil, insomnie, nervosité
- Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
- Modification du bilan hépatique : ASAT, ALAT, PAL, LDH, GGT, bilirubine
- Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie
- Augmentation du taux sanguin d'azote uréique
- Perte d'appétit
- Symptômes de type grippaux
- Réactions allergiques (éruptions cutanées, prurit)
- Anomalies hématologiques (rares) : anémie, leucopénie, thrombopénie

## Contre-indications

- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients
- Enfants < 4 ans (pas de données)
- Allaitement (pas de données)

## Précautions d'emploi

- Surveillance biologique : bilan hépatique, NFS
- Grossesse (peu de données)

## Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Mnesis® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

