

# Hydrate de chloral

NERVIFENE®

## Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction de prescripteurs

## Présentation et caractéristiques

Hypnotique, sédatif (action de 5 à 8 heures)

### Présentation :

- Solution buvable 100mg/mL (flacon de 125mL)  
*Excipients : Saccharose, arômes, colorant E150*

### Caractéristiques :

- Conservation à T° ambiante entre 15°C et 25°C
- Après ouverture : conservation 1 mois à T° ambiante < 25°C

## Indications

- Sédation dans le cadre d'une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) : chez l'enfant âgé de 2 mois à 4 ans
- Sédation dans le cadre d'une IRM : chez l'enfant âgé de 6 mois à 4 ans

## Posologie et mode d'administration

► 50 à 75 mg/kg  
en une prise par voie orale

- Diluer dans de l'eau froide avant l'administration.
- L'arrière goût âcre peut être éliminé en buvant un peu d'eau sucrée après l'administration.
- Administration également possible par voie rectale.
  
- Durée d'action : environ 5 à 8 heures
- Limiter au maximum la répétition des administrations.

## Interactions médicamenteuses

- Alcool
- Somnifères
- Antidépresseurs
- Anti-épileptiques
- Anti-hypertenseurs
- Anticoagulants

## Principaux effets indésirables

- Irritation du système gastro-intestinal : ballonnements, diarrhées, nausées, vomissements
- Désorientation, somnolence, confusion
- Maux de tête
- Etats d'excitation
- En cas de surdosage : hypotension, troubles du rythme cardiaque

## Contre-indications

- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients
- Fièvre
- Insuffisance hépatique
- Insuffisance rénale
- Insuffisance cardiaque, troubles du rythme
- Porphyrisme
- Ulcère gastroduodénal
- Insuffisance respiratoire, apnée du sommeil
- Hypertension intracrânienne
- Grossesse, allaitement
- Conduite de véhicules et utilisation de machines

## Précautions d'emploi

- Dépendance (si utilisation chronique)

## Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Nervifène® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

