

# Dronabinol

MARINOL®

## Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative

Médicament soumis à la réglementation des stupéfiants

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction de prescripteurs

## Présentation et caractéristiques

Cannabinoïde (activité sympathomimétique centrale)

### Présentation :

- Capsule molle de 2,5 mg (boîte de 60 capsules)  
*Excipients : Gélatine, glycérine, huile de sésame, dioxyde de titane*

### Caractéristiques :

- Conservation entre +8 et +15°C ou au réfrigérateur

## Indications

- Douleurs neuropathiques
- Anorexie liée au SIDA
- Nausées et vomissements sévères causés par une chimiothérapie

## Posologie et mode d'administration

<p><u>Douleurs neuropathiques</u></p> <p><u>Anorexie liée au SIDA</u></p>	<p>► Dose initiale : 2,5 mg x 2/jour, avant le déjeuner et le dîner.</p> <p>► La dose peut être diminuée à 2,5 mg/jour ou augmentée jusqu'à 20 mg/jour max répartie en plusieurs prises.</p>
<p><u>Nausées et vomissements causés par la chimiothérapie</u></p>	<p>► 5 mg/m<sup>2</sup> 1 à 3 h avant la chimiothérapie, puis toutes les 2 à 4 h après la chimiothérapie</p> <p>► Maximum de 4 à 6 doses par jour (dose pouvant être augmentée par palier de 2,5 mg/m<sup>2</sup> jusqu'à un max de 15 mg/m<sup>2</sup>)</p>

- Ne pas écraser ou mâcher les capsules

## Interactions médicamenteuses

- Alcool
- Cannabis
- Amphétamine, cocaïne, agents sympathomimétiques
- Atropine, scopolamine, agents anticholinergiques
- Antidépresseurs tricycliques, dépresseurs du SNC
- Disulfiram, fluoxétine, théophylline

## Principaux effets indésirables

- Asthénie
- Palpitations, tachycardie, vasodilatation / flush
- Douleurs abdominales, nausées, vomissements
- Anxiété, confusion, vertiges, troubles de la personnalité, euphorie, paranoïa, somnolence, pensées anormales

## Contre-indications

- Hypersensibilité au principe actif ou à un excipient

## Précautions d'emploi

- Convulsions
- Syndrome de sevrage
- Troubles cardiaques, troubles psychiatriques
- Association à d'autres médicaments agissant sur le SNC
- Conduite de véhicules ou utilisation de machines
- Patients consommateurs de drogues et/ou d'alcool
- Grossesse, allaitement
- Personnes âgées : diminuer la posologie
- Enfants : pas de données

## Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Marinol® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

 Rappeler au patient que les comprimés de Marinol® ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le patient doit ramener au pharmacien les médicaments inutilisés.

