

Béthanéchol

MYOCHOLINE®

Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction de prescripteurs

Présentation et caractéristiques

Parasympathomimétique avec effet relativement sélectif sur la musculature lisse de la vessie et du système gastro-intestinal

Présentations :

- Comprimés sécables de 10 mg de chlorure de béthanéchol (boîtes de 50 cpr)
- Comprimés sécables de 25 mg de chlorure de béthanéchol (boîtes de 50 ou 100 cpr)

Excipients : Sulfate de calcium dihydraté, talc, amidon de maïs, stéarate de magnésium

Caractéristiques :

- Conservation à T° ambiante entre 15 et 25°C

Indications

- Affections pour lesquelles une stimulation du muscle vésical est indiquée :
 - Rétention urinaire par atonie vésicale post-opératoire
 - Faiblesse neurogène du détrusor

Posologie et mode d'administration

► 25-50 mg
jusqu'à 4 fois par jour

- Débuter à faible dose puis augmenter jusqu'à obtention de l'effet optimal.
- Arrêter après diminution des symptômes.
- A prendre à jeun avec un peu d'eau, 1 heure avant un repas ou 2 heures après un repas.

Interactions médicamenteuses

- Anticholinergiques et cholinergiques

Principaux effets indésirables

- Hypersalivation, hypersudation
- Hypothermie
- Bradycardie, chute tensionnelle
- Vertiges, hypotension orthostatique, surtout en début de traitement
- Diarrhées, nausées, vomissements
- Sensation de miction impérieuse
- Eruption cutanée
- Troubles biologiques : amylase sérique, lipase sérique, ASAT

Contre-indications

- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients
- Asthme
- Hypo- ou hypertension artérielle, pathologie coronarienne, bradycardie, troubles de la conduction AV
- Hyperthyroïdie
- Ulcère gastro-duodéal
- Maladie de Parkinson
- Epilepsie
- Dyssynergie vésico-sphinctérienne externe (sauf si une relaxation effective du sphincter externe est présente suite à une opération gastro-intestinale)
- Occlusion mécanique ou autres obstructions des voies urinaires ou du tube digestif
- Tonus vagal marqué
- Péritonite
- Grossesse et allaitement

Précautions d'emploi

- Conduite de véhicules et utilisation de machines
- Enfant (peu de données)

Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Myocholine® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

