


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Attention aux médicaments contenant du millepertuis.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture:

.....
.....
.....

Tél :

.....

Sofosbuvir

SOVALDI®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est **un traitement de l'hépatite C chronique.**

Il est prescrit par un médecin hospitalier, spécialiste en hépato-gastro-entérologie, en infectiologie ou médecine interne.

Il est disponible dans les pharmacies hospitalières et les pharmacies de ville.

SOVALDI se présente sous la forme d'un flacon de 28 comprimés jaunes de 400 mg.

Posologie Conseils de prise

Sofosbuvir
SOVALDI®

Principaux effets indésirables

Plan de prise

Posologie : **1 comprimé 1 fois par jour, au cours d'un repas.**

En cas d'oubli :

- <18h après l'heure habituelle de la prise : prenez immédiatement le comprimé oublié, puis prenez le comprimé suivant à l'heure habituelle.
- >18h après l'heure habituelle de la prise : ne prenez pas le comprimé oublié puis prenez le comprimé suivant à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose.

En cas de vomissement :

- <2h après la prise : prenez un autre comprimé.
- >2h après la prise : ne reprenez pas de comprimé, et prenez le comprimé suivant à l'heure habituelle.



Conservez à température ambiante 30 jours maximum après ouverture du flacon.



Conservez hors de portée des enfants.

Quelques conseils



Le comprimé doit être avalé entier de préférence avec de l'eau.



Prendre ce médicament aux mêmes heures chaque jour vous aidera à ne pas oublier votre traitement.



N'écrasez pas le comprimé, ne le croquez pas, ne le mâchez pas (goût amer).



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans en parler à votre médecin.



Si vous planifiez une grossesse, parlez-en à votre médecin.
Une contraception efficace chez la femme et chez l'homme doit être mise en place en cas d'association à la ribavirine.
L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.



Si vous avez pris plus de SOVALDI® que vous n'auriez dû, informez votre médecin.

	Insomnie, fatigue, maux de tête	Si ces signes deviennent trop gênants, parlez-en à votre médecin.
	Nausées	Évitez les repas trop gras, à odeur forte. Fractionnez les repas. Mangez lentement. Si les nausées persistent, parlez-en à votre médecin pour la mise en place d'un traitement.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;