


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Attention aux médicaments contenant du millepertuis.**

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....  
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....  
.....  
.....

Tél :

.....  
.....

## Elbasvir/grazoprevir

**ZEPATIER®**

### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **traitement de de l'hépatite C chronique.**

Il est prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en hépato-gastro-entérologie, en médecine interne ou en infectiologie

Il est disponible dans les pharmacies hospitalières et les pharmacies de ville.

Ce sont des comprimés beiges de 50 mg / 100 mg  
Boîte contenant 28 comprimés (2 pochettes contenant chacune 14 comprimés)

# Posologie Conseils de prise

## Elbasvir / Grasoprevir ZEPATIER®

# Principaux effets indésirables

### Plan de prise

Posologie : 1 comprimé 1 fois par jour, au cours ou en dehors du repas

.....

.....

.....

#### En cas d'oubli

- <16h après l'heure habituelle de la prise : prenez immédiatement le comprimé oublié, puis prenez le comprimé suivant à l'heure habituelle.
- >16h après l'heure habituelle de la prise : ne prenez pas le comprimé oublié puis prenez le comprimé suivant à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose.

En cas de vomissement <4h après la prise : prenez un autre comprimé



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans en parler à votre médecin.

### Quelques conseils



Le comprimé doit être avalé entier de préférence avec de l'eau.



Prendre ce médicament aux mêmes heures chaque jour vous aidera à ne pas oublier votre traitement



N'écrasez pas le comprimé, ne le croquez pas.



Conservez hors de portée des enfants.



Si vous planifiez une grossesse, parlez en à votre médecin. Une contraception efficace chez la femme et chez l'homme doit être mise en place en cas d'association à la ribavirine. L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.



Prévenez votre médecin en cas d'intolérance au glucose ou galactose

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;

	Nausées	Evitez les repas trop gras, à odeur forte. Fractionnez les repas. Mangez lentement. Si les nausées persistent, parlez-en à votre médecin pour la mise en place d'un traitement.
	Maux de tête, fatigue	Essayez de vous reposer. Si ces signes deviennent trop gênants, parlez-en à votre médecin.



En cas d'apparition d'une fatigue, d'une faiblesse, d'un manque d'appétit, de nausées / vomissements, d'un ictère ou de selles claires, consultez votre médecin.