

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Si vous prenez un médicament contenant de fer, prenez le à distance du CAPTIMER®.

Informez votre médecin si vous devez prendre des anti-inflammatoires ou des mucolytiques car le CAPTIMER® peut augmenter l'effet de ces médicaments.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital
.....
.....
Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :
.....
.....
.....

Tél :
.....
.....

Tiopronine

CAPTIMER®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament permet d'éviter l'accumulation de cystine dans vos reins et la formation de calculs de cystine.

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières.**

Ce sont des comprimés blancs dans un flacon contenant 100 comprimés.

Il existe un seul dosage :
• CAPTIMER® 250 mg

Posologie Conseils de prise

Tiopronine CAPTIMER®

Principaux effets indésirables

Plan de prise

La dose prescrite est adaptée individuellement en fonction de votre état de santé et de vos résultats de laboratoire. Elle est également adaptée en fonction du poids et de l'âge.

Posologie : **Prendre le(s) comprimé(s) 30 minutes avant un repas.**

.....

.....

.....

En cas d'oubli, prenez les comprimés oubliés dès que vous vous en rendez compte mais ne prenez jamais de double dose.

Quelques conseils



Les comprimés doit/doivent être avalé(s) entier(s) avec un grand verre d'eau.



Prendre ce médicament aux mêmes heures chaque jour vous aidera à ne pas oublier votre traitement.



N'écrasez pas le(s) comprimé(s), ne le(s) mâchez pas.



Ne pas boire d'alcool pendant le traitement.



Si vous avez pris plus de CAPTIMER® que vous n'auriez dû, informez votre médecin.



Boire 2 à 3 litres d'eau par jour et limiter la consommation de sel.



Il est important de bien réaliser les prises de sang prescrites par votre médecin. Consultez en cas de fièvre et en cas d'essoufflement anormal.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans en parler à votre médecin.



Prévenez votre médecin en cas d'intolérance à certains sucres.



Si vous envisagez une grossesse, parlez-en à votre médecin. L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.



Conservez à température ambiante 30 jours maximum après ouverture du flacon.



Conservez hors de portée des enfants.

	Réactions cutanées	En cas de persistance et d'aggravation, consultez votre médecin.
	Fièvre	Consultez votre médecin.
	Troubles du goût	Si ces signes sont trop gênants, parlez-en à votre médecin..
	Diarrhées	Régime alimentaire sans fibres. Mangez des pommes, des coings, du riz et du pain blanc. Ne mangez pas de fruits ni de laitages. Buvez souvent de petites quantités d'eau, thé ou café ...
	Nausées, maux d'estomac	Évitez les aliments trop gras et à odeur trop forte.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;