


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Si vous souffrez de brûlures d'estomac, ne prenez pas de médicaments (ex: oméprazole...) sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Glécaprévir / Pibrentasvir

MAVIRET®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un traitement de l'hépatite C chronique.

Il est prescrit par un médecin hospitalier, spécialiste en hépato-gastro-entérologie, médecine interne ou infectiologie.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières.


Ce médicament se présente sous la forme d'une boîte de 84 comprimés roses contenant 100mg de Glécaprévir et 40mg de Pibrentasvir.

Posologie Conseils de prise

Glécaprévir/Pibrentasvir MAVIRET®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Quelques conseils



Prenez toujours vos comprimés au cours d'un repas en 1 prise par jour.



Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau



Ne croquez pas, ne mâchez pas ou n'écrasez pas les comprimés.



N'arrêtez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin.



En cas d'oubli:

-<18h après l'heure habituelle de la prise: prenez immédiatement les comprimés oubliés puis prenez la dose suivante à l'heure habituelle

->18h après l'heure habituelle de la prise: ne reprenez pas les comprimés oubliés et prenez les comprimés suivants à l'heure habituelle.



En cas de vomissement:

-<3h après la prise: prenez 3 nouveaux comprimés

- >3h après la prise: ne reprenez pas de comprimés et prenez les suivants à l'heure habituelle



Si vous envisagez une grossesse, parlez-en à votre médecin.
L'allaitement est déconseillé.



Conservez à température ambiante.



Conservez hors de portée des enfants.

	Maux de tête	Si la douleur est trop importante parlez-en à votre médecin.
	Farigue	Si cette fatigue est trop gênante, parlez-en à votre médecin.
	Diarrhées	Ne mangez pas de légumes, ni de fruits ni de laitage. Préférez les féculents : riz, carottes cuites, pain blanc. Buvez abondamment de petites quantités d'eau.
	Nausées	Mangez par petites quantités. Évitez les repas trop gras et trop copieux,

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;