


Ce médicament **peut interagir avec d'autres molécules**. Donner la liste complète de vos médicaments à votre médecin, même ceux vendus sans ordonnance.

L'injection de **certains vaccins est déconseillé** pendant le traitement. Votre médecin vous indiquera si un autre type de vaccin doit être prescrit.



Ne pas prendre de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Fingolimod

GILENYA®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des **formes très actives de la sclérose en plaque (SEP)**, il aide à réduire le nombre de poussées et à ralentir la progression. C'est un immunosuppresseur.

Il est prescrit obligatoirement **par un médecin spécialiste en neurologie ou neuropédiatre** et la prescription doit être faite sur une ordonnance particulière (médicament d'exception).

La première administration doit être effectuée en milieu hospitalier.

La première dispensation de Gilenya® s'effectue en pharmacie hospitalière et les dispensations suivantes dans les pharmacies de ville.

Dosages	Présentations
Gilenya® 0,25 mg	Gélule Boîte de 28
Gilenya® 0,50 mg	Gélule Boîte de 28

Version de février 2020

Posologie Conseils de prise

Fingolimod
GILENYA®

Principaux effets indésirables

Plan de prise

Posologie usuelle :

- **Adulte : 1 gélule de 0,5 mg par jour**
- **Enfants de plus de 10 ans :** posologie selon le poids, donnée par le médecin

La gélule peut être prise **au cours OU en dehors des repas.**

Les gélules doivent être **avalées entières avec un verre d'eau.**

Il est interdit d'ouvrir ou d'écraser la gélule.



Conserver hors de portée des enfants.

A l'abri de l'humidité.

Durée de conservation : 18 mois

Quelques conseils



En cas d'infections, fièvre > 38°C survenant lors de votre traitement, consulter votre médecin.



Limiter les contacts avec les personnes malades. Désinfecter soigneusement toute plaie.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de gélule.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



En cas d'oubli d'une dose de Gilenya® :

→ NE PAS PRENDRE de dose double
→ Des mesures de surveillance identiques à celles de l'administration de la première dose sont recommandées lorsque le traitement est interrompu. En parler à votre médecin.



Ne pas s'exposer au soleil sans protection.



La prise de Tecfidera **est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement.** En parler à votre médecin.
Une contraception efficace est nécessaire pendant toute la durée du traitement.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Les rapporter à votre pharmacien.

	Maux de tête, migraine, fatigue	En cas de céphalées sévères et soudaines contacter votre médecin.
	Diarrhées	Boire entre les repas. Éviter les aliments frits, gras, épicés. Manger lentement. Faire plusieurs repas légers.
	Troubles cardiaques	Diminution transitoire de la fréquence cardiaque.
	Infections Diminution taux globules blancs	Régulièrement, des analyses seront effectuées pour voir si ce taux diminue.
	Troubles de la vision	Contactez le médecin en cas de troubles visuels. Des bilans ophtalmologiques peuvent être prescrits.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;



Contactez rapidement votre médecin

en cas de:

- réaction allergique sévère
- d'infection