

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de communiquer la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin ou pharmacien



Informez votre médecin si vous prenez ou avez pris des médicaments antiallergiques (antihistaminique ou corticoïde) car ils peuvent altérer les résultats des tests diagnostiques cutanés

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



Version d'Aout 2020

Venin d'abeille

Apis mellifera

120 microgrammes

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement de désensibilisation des sujets allergiques au venin d'abeille. Il est également utilisé pour le diagnostic de l'hypersensibilité au venin d'abeille à la suite de tests diagnostiques avérés positifs ou d'une réaction allergique sévère.

Il est administré chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant de plus de 2 ans.

Le traitement est prescrit par un médecin allergologue ou spécialisé dans l'immunothérapie allergique. Il nécessite une surveillance médicale durant au moins les 30 minutes après l'injection.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières.

C'est un flacon contenant une poudre à reconstituer pour injection sous-cutanée. Chaque flacon contiendra une solution à 100µg/mL de venin après reconstitution avec 1,2 mL de solvant.

Posologie Conseils de prise

Venin d'abeille Apis mellifera

Principaux effets indésirables

Plan de prise

Utilisation pour le test diagnostic

Le test diagnostique devra être réalisé au moins 2 semaines après la réaction allergique afin d'éviter les faux négatifs. En cas de test négatif, à la suite d'une réaction allergique importante, le test devra être réalisé à nouveau 1 à 2 mois plus tard.

Utilisation dans le cadre du traitement par immunothérapie allergique

Le traitement comporte deux étapes: la phase d'initiation du traitement et la phase d'entretien

La phase d'initiation du traitement, réalisée en milieu hospitalier, consistera à augmenter progressivement la dose en fonction de la tolérance jusqu'à atteindre la dose d'entretien (celle-ci est souvent de 100µg mais peut aller jusqu'à 200 µg pour les apiculteurs ou les personnes non suffisamment protégées à 100µg)

La phase d'entretien consistera à une injection toutes les 4 semaines durant la première année puis d'une injection toutes les 4 à 6 semaines les années suivantes. La durée du traitement est au minimum de 5 ans.

**Conserver au réfrigérateur (+2 à +8°C) jusqu'à 2 ans avant reconstitution .
Après reconstitution , la solution pourra être conservée 28 jours au réfrigérateur.**



Conserver hors de portée des enfants.

Quelques conseils



Sortir le produit et son solvant du réfrigérateur 30 minutes avant l'injection pour qu'ils soient à température ambiante



Injecter le traitement uniquement par voie sous-cutanée



Rester sous surveillance médicale pendant **au moins 30 minutes** après l'injection.



Conserver soigneusement votre carnet de suivi du traitement. Le médecin y mentionnera la date et la dose administrée.



Ne pas utiliser ce traitement si vous avez une maladie immunitaire (**maladie chronique auto-immune**), si vous avez un **asthme et/ou des symptômes respiratoire non contrôlés ou sévères**.



Les repas copieux, l'alcool, les bains chauds ainsi que les activités sportives sont déconseillées les jours où les injections sont réalisées.



Si vous envisagez une grossesse, si vous êtes enceinte ou vous allaitez, parlez-en à votre médecin avant de commencer l'immunothérapie allergénique.

	Réactions au site d'injection (rougeur, douleur, œdème et prurit)	Signalez le à votre médecin
	Réactions cutanées (gonflement, rougeur, démangeaison, urticaire diffus..)	Signalez le à votre médecin
	Toux, gêne respiratoire, bronchospasme	Signalez le à votre médecin ou contacter le SAMU si ces symptômes sont importants et non contrôlés (signes avant cureur du choc anaphylactique)
	Choc anaphylactique (malaise avec diminution brutale de la tension artérielle)	Utilisez la trousse d'urgence prescrite par votre médecin avec injection d'adrénaline auto-injectable Appelez le SAMU (composé le 15 ou le 112)
	Nausées, douleurs abdominales	Mangez par petites quantités. Évitez les repas trop gras et trop copieux, Ne pas consommer d'alcool

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;