


Ce médicament peut **interagir avec de nombreuses autres molécules**. Il est contre-indiqué de prendre Coumadine® avec du millepertuis, du miconazole, du phénylbutazone, mais aussi certaines formes d'acide acétylsalicylique

N'oubliez pas de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien**



Version Juin 2020

# Warfarine

COUMADINE®

## À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **anticoagulant oral**. Il est utilisé pour fluidifier le sang pour éviter la formation de caillots, ou les dissoudre.

Dosages	Présentations
<b>Coumadine® 2 mg</b>	Comprimé sécable rose. Boîte de 20
<b>Coumadine® 5 mg</b>	Comprimé sécable blanc. Boîte de 30

## Suivi du traitement par Coumadine

Il faut réaliser des prises de sang régulières dans un même laboratoire pour mesurer l'**INR** :

- L'INR doit être compris entre 2 valeurs cibles, fixées par votre médecin
- Vous devez récupérer vos résultats d'INR le jour-même
- Si l'INR sort de ces valeurs : contactez votre médecin
- Faites toujours ces mesures **dans le même laboratoire**

Il est nécessaire de tenir **un carnet de suivi** : demandez le à votre pharmacien ou médecin

# Posologie Conseils de prise

Warfarine  
COUMADINE®

# Principaux effets indésirables

## Plan de prise



Une prise quotidienne, **le soir**, toujours à la même heure, pendant ou en dehors des repas, sans oublier.

Il est fortement recommandé de prendre Coumadine le soir en cas d'adaptation posologique faite par le médecin, après avoir obtenu vos résultats INR l'après-midi

Bien respecter la dose prescrite par votre médecin.

Avalez les comprimés avec un verre d'eau



Conservez hors de portée des enfants.

Signalez que vous prenez un traitement Coumadine à tout professionnel de santé

A conserver au maximum 2 ans, à une température inférieure à 30°C

## Quelques conseils



Portez une carte mentionnant votre traitement anticoagulant  
Surveillez étroitement **le risque de saignement**  
Remplissez régulièrement **vos carnets**



Ne jetez pas les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



Ayez une alimentation **équilibrée et variée**. L'alcool peut modifier l'effet anticoagulant du médicament. Le jeûne augmente l'effet anticoagulant.



**N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration** sans avis du médecin prescripteur.



**Si vous avez oublié de prendre Coumadine :**

- La prise est possible dans les 8 heures après l'heure habituelle
- Passé ce délai, ne rattrapez pas la dose oubliée.
- NE PAS doubler la dose
- Notez tout oubli dans votre carnet de suivi



Il est **contre-indiqué de prendre Coumadine® pendant la grossesse**. Parlez-en à votre médecin : il existe d'autres types d'anticoagulants qui peuvent être pris lors de la grossesse.

Il est **possible de prendre Coumadine pendant l'allaitement**.

 	<b>Saignements</b>	Apparition de saignements même mineurs : <ul style="list-style-type: none"><li>- saignement de nez ou gencives</li><li>- Hématomes</li><li>- présence de sang dans les urines</li><li>- présence de sang dans les selles ou selles noires et malodorantes</li><li>- vomissements ou crachats sanglants</li><li>- saignements qui ne s'arrêtent pas</li></ul>
	<b>Saignements internes non visibles</b>	Les signes pouvant évoquer: <ul style="list-style-type: none"><li>- pâleur</li><li>- fatigue ou essoufflement inhabituels</li><li>- maux de tête persistants</li><li>- malaise inexplicable</li></ul>

Si des saignements apparaissent, prévenez **directement** votre médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;



**Consultez immédiatement votre médecin ou appelez le samu en composant le 15** en cas :

- de saignement
- d'hémorragie sévère, dans ce cas arrêtez toute prise de COUMADINE